

三 峰 鲷 科

Helotes sexlineatus (Quoy et Gaimard)

(斑猪、海黄蜂)

背鳍 XI-I-10; 臀鳍 III-10; 胸鳍 13; 腹鳍 I-5; 尾鳍 17。侧线鳞 80—83, 13-17/20-24。

体长 105—154 毫米。体长为体高 3.6—4 倍, 为头长 4—4.5 倍。头较小, 头长小于体高, 头长为吻长 3.4—4 倍, 为眼径 3—3.8 倍。眼大, 眼径等于眼间隔。口大。两颌齿细小, 呈不规则多行,




图 343 三峰鲷

外列一行较大, 排列紧密, 每一齿具三尖峰, 齿尖端棕色。犁骨、腭骨及舌上无齿。前鳃盖骨边缘具细锯齿。鳃盖骨下棘大。只鸟喙骨外露, 具有锯齿。第一鳃弓上鳃耙短, 鳃耙数 7—8+13—16。体被细栉鳞。背鳍鳍棘部与鳍条相连有一深缺刻。臀鳍与背鳍鳍条部相对。胸鳍宽短。腹鳍位于胸鳍基后下方。尾鳍分叉。体背部棕褐色, 腹部色浅。体每侧有四条灰褐色平行纵带。背鳍鳍棘上约 2/3 黑色。

为近岸性热带种类, 可进入淡水。

分布于印度尼西亚, 越南, 中国, 菲律宾, 大洋洲。在我国产于南海及东海南部。

鲷 科

Therapon theraps Cuvier et Valenciennes

(丁公、石或、硬头浪)

背鳍 XI-1-10; 臀鳍 III-8; 胸鳍 12; 腹鳍 1-5; 尾鳍 17。侧线鳞 51—53, 9-10/15-17。

体长 95—156 毫米。体长为体高 2.6—3.2 倍, 为头长 3.1—3.7 倍。头中等大, 后头部背面具骨质隆起线纹, 头长为吻长 3.1—3.8 倍, 为眼径 3.4—4 倍。眼中等大, 眼径约与吻长相等。眶




图 344 鲷

前骨下缘有细锯齿。两颌齿内列细小呈带状, 外列一行较大。犁骨、腭骨及舌上无齿。前鳃盖骨边缘具细锯齿。鳃盖骨有 2 棘, 下棘强大延伸至鳃盖后方。上肩胛骨及鸟喙骨外露, 其边缘具有小锯齿。第一鳃弓上鳃耙细扁, 鳃耙数 7—8+14—16。体被厚栉鳞。背鳍鳍棘部与鳍条部相连, 中间有一浅凹陷。背鳍鳍棘强硬。臀鳍与背鳍鳍条部相对。胸鳍宽短。腹鳍位于胸鳍后下方。尾鳍分叉。体背部灰褐色, 腹部色浅。体侧有四条棕黑色纵带。背鳍第 3—7 鳍棘间有大黑点, 第 1—4 鳍条末及第 6—8 鳍条间各有黑斑。尾鳍上有 5 条黑斑带。

为热带种类。产量大, 具有经济价值, 唯鳞厚肉粗, 列入次等鱼类。

分布于红海, 印度, 越南, 中国, 菲律宾。在我国产于南海和东海南部。