

间 𩚰 𩚰 科

Hemirhamphus intermedius Cantor

背鳍II-12;臀鳍II-13;胸鳍I-10;腹鳍I-5。
侧线鳞43—46。

体长90—148毫米。体长为体高的8.7—9.8倍,为体宽的10.7—14倍,为头长的4.4—5.1倍。头长为吻长的2.4—2.7倍,为眼径的4—4.5倍,为眼间隔的3.8—4.5倍。体中等大,背腹缘微凸出,体高大于体宽。头较小,前方尖形。吻较



图 287 间 𩚰

长。眼较大,圆形,侧位而高。眼间隔稍凸起,微短于眼径。鼻孔呈长圆形,位于眼前缘的上侧方。口小。上颌由颌间骨形成三角形,下颌突出延长成针状喙。两颌仅于相对部分有牙,犁、腭骨部及舌上无牙。鳃孔大。鳃盖膜不与峡部相连。肛门位于臀鳍的前方。体被较大的圆鳞,极易脱落,头上仅吻上三角部具鳞,余皆裸出。侧线明显,位置低,近体侧下缘,侧线鳞小而薄,呈长圆形。胸鳍较短小,稍大于头长的二分之一,侧位而高。背鳍、臀鳍同形,大小相似,均位于体后方。腹鳍较小。尾鳍叉形,下叶长于上叶。

分布于我国各海区。

吉 氏 𩚰 𩚰 科

Hemirhamphus georgii Cuvier et Valenciennes

背鳍II-13;臀鳍II-12;胸鳍I-10;腹鳍I-5。
侧线鳞55—59。

体长158—204毫米。体长为体高的8—9倍,为体宽的12.7—14.8倍,为头长的4.4—4.5倍。头长为吻长的2.2—2.4倍,为眼径的4.2—4.8倍,为眼间隔的3.5—4倍。体长而侧扁,横切面呈长方形。眼圆,侧位而高。鼻孔略呈圆形,鼻突呈

穗状,位于眼前侧上方。口较大。上颌由颌间骨形成为等腰三角形,其长大于宽,中间有一隆起脊。两颌仅相对处有牙,前方牙呈细锥状,犁、腭骨部及舌上无牙。鳃孔宽阔。鳃耙发达。鳃膜条细弱。肛门位于臀鳍前方。体被圆鳞,较易脱落,头上仅上额三角部有鳞,余皆裸露。侧线位低,近体下缘。背、臀鳍相对。胸鳍侧位而高。腹鳍腹

位。尾鳍叉形。浸制的标本,体呈淡黄色,体侧具较宽的灰黑色纵带一条,于背鳍下方最宽,头部背方呈灰黑色。

分布于东海及南海。




图 288 吉 氏 𩚰