

西里伯蛇鳗 蛇鳗科

Ophichthys celebicus (Bleeker)

体长 171—435 毫米。体长为体高 33—36 倍，为头长 8.3—9.6 倍。头长为吻长 5.5—6 倍，为眼径 9.8—11.5 倍，为眼间隔 6—7.5 倍。身体为长圆筒状，仅尾端稍侧扁。肛门位于身体前半部，




图 279 西里伯蛇鳗

头躯部和尾部的比为 3 比 4。头前端稍平扁，后部为圆筒状。口裂大，口角超过眼后缘。眼小，约位于头前端四分之一处口裂的中部。上唇无锯状小须。前鼻孔为管状，位于吻端边缘上，后鼻孔不为管状，位于眼前。牙尖形，上下颌牙均为两行，前颌骨部牙与犁骨牙分离。鳃孔大，位于胸鳍基部。无鳞。有侧线。背鳍起点在胸鳍上方。臀鳍起点在肛门后方。背、臀鳍不相连接，距尾尖端有一短距离。无尾鳍，尾端尖。有胸鳍。无腹鳍。体色上半部棕灰，下半部较淡。

分布于南海。

光滑鸭嘴鳗 丝鳗科

Chlopsis fierasfer Jordan et Snyder

体长 215—359 毫米。体长为体高 37.4—50 倍，为头长 8.4—10 倍。头长为吻长 2.4—2.6 倍，为眼径 9.4—13.4 倍，为眼间隔 14—21 倍。身体为长管状，后部侧扁，尾部逐渐变细，最后部很细，肛门位于身体前半部。尾部约为头躯干部的 3 倍。




图 280 光滑鸭嘴鳗

头前部细尖，后部管状。吻尖。上颌长于下颌，尖端柔软。眼大，圆形，位于头的中部而稍偏前方。口裂大，口角达于眼后缘。前后鼻孔均为裂孔状。前鼻孔近吻端，后鼻孔位于眼前缘的直前方。舌不能活动。上下颌腭骨部有尖牙，成带，领骨部牙和腭骨部牙不分离。鳃孔小，侧下位。无鳞。有侧线。背鳍起点稍后于鳃孔。臀鳍起点在肛门后方。背、臀鳍和尾鳍相连接。无胸鳍及腹鳍。全体淡棕色，尾端黑色。

分布于南海及台湾海域。