

白边乌鳢 鳙科

Ophiocephalus gachua Hamilton

背鳍 34—37；臀鳍 24—25；胸鳍 16；腹鳍 6。
侧线鳞 45，3/7。

全长 190 毫米。体长 175 毫米，为头长 3.2 倍，为体高 6.0 倍。头长为吻长 5 倍，为眼径 9.6 倍，为尾柄高 3.2 倍。体形呈棒状，头部的鳞片比躯干部上的大些，鼻孔有管膜，全身各鳞片上有灰色小斑点。各鳍上的斑点比较分散。最特殊者，各奇鳍的边缘上有明显的白色边，尾鳍上者尤为明显。

经济价值与乌鳢同。

分布在海南岛及珠江水系、云南等。




图 321 白边乌鳢

月鳢 鳙科

Channa asiatica (Linnaeus)

(七星鱼、花财鱼)

背鳍 47；臀鳍 29；胸鳍 14。侧线鳞 59—62，
6/6—7。

全长 300 毫米。体长 250 毫米，为头长 3.9 倍，为体高 5.7 倍。头长为眼径 4.3 倍，为吻长 6.6 倍，为尾柄高 1.8 倍。体形与乌鳢很相似，但此鱼没有腹鳍，头部有较大的鳞片，头部的感觉小孔很少。体色棕灰，腹部色较浅，体侧有 V 形黑纹十余条。在尾鳍的基部和胸鳍的上方各有一大形黑斑。头上、背上和体侧有许多白色小斑。从鳃盖到眼后方每侧各有黑纹两条。

其经济价值与乌鳢同。

分布在长江以南，由云南到苏州都有记载，四川和长江以北尚未发现。




图 322 月鳢