

角 箱 鲀 箱 鲀 科

Ostracion cornutus Linnaeus

背鳍 8—10; 臀鳍 9; 胸鳍 11; 尾鳍 $i+8+i$ 。
 鳃耙外行 0+13。

体长 51.7—127 毫米。体甲四棱形; 背侧棱与腹侧棱发达, 背棱前端及腹棱后端各有一长棘。棘长为眼径 1—2.4 倍, 大鱼较长。体甲在背鳍基与臀鳍基后方均闭合为横板状突; 背中棱很低, 小鱼且有一三角形小突起; 腹面微圆凸; 体甲鳞多为六角形, 鳃孔后一纵行约 9—10 鳞, 侧面一横行 6—7 鳞, 背面一横行 7 鳞, 腹面一横行 8—10 鳞; 鳞面有许多辐状细纹和粒状小突起。体长为体高




图 575 角箱鲀

2.2—2.7 倍, 为体宽 1.8—2.4 倍, 为头长 3.2—3.7 倍。尾柄细弱, 除前端上下侧外, 全被光皮。头短高, 后半部四棱状, 背面及侧面凹形; 头长为吻长 2.8—4.3 倍, 为眼径 3.2—3.7 倍。吻很陡斜, 略突出。眼侧上位。眼间隔宽约为眼径 2 倍。口小, 前位, 很低, 较眼窄。上下颌每侧各有 4—5 柱状牙。唇发达。鳃孔侧下位, 直立短缝状。无侧线。背鳍小, 位肛门上方。臀鳍与背鳍相似而较后。胸鳍侧下位。无腹鳍及腰骨。尾鳍截形, 为头长 1.1—2.5 倍, 大鱼甚长。体淡黄且微绿, 小鱼背面有蓝黑点。尾柄红紫色有大黑斑。各鳍淡黄, 大鱼尾鳍黄绿色且有黑斑。

为热带海鱼。血及内脏有弱毒, 肉洗净或腌后可食。

分布于东非到夏威夷, 澳大利亚到日本。中国青岛到广东均产。

黑 鳃 兔 头 鲀 鲀 科

Lagocephalus inermis (Temminck et Schlegel)

背鳍 $ii-12$; 臀鳍 $ii-10$; 胸鳍 $ii-16$; 尾鳍 8 (分枝)。鳃耙外行 1+11, 内行 0+11。

体长 99.7—259 毫米。头体长形, 前方粗圆, 向后渐尖, 腹侧有一纵皮棱; 体长为体高 1.7—3.5 倍, 为头长 2.5—2.7 倍。尾柄似锥状。头粗大, 头长为吻长 1.7—2 倍, 为眼径 4.7—5.8 倍。吻钝圆。眼稍小, 侧位而很高。眼间隔宽为眼径 1.7—2.3 倍。二鼻孔位皮囊突起两侧。口稍小,




图 576 黑鳃兔头鲀

前位。上下颌骨与牙齿呈四个大牙状, 颌骨缝显著。唇发达。鳃孔侧中位, 直立形, 长于眼径。鳃 3 个。鳞已消失, 背侧皮肤有细丝状纵纹, 头至肛门前腹侧具小刺。侧线后端侧中位, 向前渐高, 头部有项背枝、头侧枝、眼上下枝及吻背枝。背鳍尖刀状, 位尾部。臀鳍与背鳍相似而较后。胸鳍宽扇状, 略低于鳃孔。无腹鳍。尾鳍凹叉状。背侧灰褐, 侧上黄褐, 侧下白色, 侧下方自口角到尾鳍基金黄色纵带状; 有些背侧有 2—3 灰黑色不明显的横带状斑。鳍均黄色, 背鳍及尾鳍末端稍暗, 腹膜及鳃腔膜黑色。

为热带肉食性底栖海鱼。内脏及血有剧毒, 肉洗净或盐腌后可食。为底拖网对象之一。

分布于东非, 印度, 印度尼西亚, 菲律宾, 澳大利亚, 日本, 中国浙江到广东。