

## 五指马鲛

马鲛科

*Polynemus plebejus* Broussonet

背鳍 VIII, I-13; 臀鳍 III-11; 胸鳍 17—18 + 5; 腹鳍 I-5。侧线鳞 61—66, 7—8/11—12。

体长 130—320 毫米。体长为体高 3.3—3.8 倍, 为头长 2.8—3.5 倍。头长为吻长 4.7—5.3 倍。体长, 侧扁, 背腹缘均圆钝。头中等大, 前端圆钝。吻短与眼径约等长, 突出于口部前方。眼大, 侧位, 脂膜发达; 眼间隔宽阔。上唇不发达, 下唇比较发达, 但不达缝合处。上下颌、犁骨部、腭骨部有成狭带的细牙。颌牙均不露出。鳃孔大, 鳃盖膜不与峡部相连。头及吻部有鳞, 第二背鳍及臀鳍基部有发达的鳞鞘, 鳍上有小形鳞, 胸、腹鳍基部有大形腋鳞。侧线完全。第一背鳍起点在胸鳍及腹鳍起点的中间, 有较弱的鳍棘。第二背鳍起点在臀鳍起点前方, 上缘凹形。臀鳍与第二背

鳍同形, 并约与其相对。胸鳍颇长, 位置低, 近于腹缘, 下方有 5 条游离的丝状鳍条, 其长超过胸鳍最长的鳍条。腹鳍小, 不达于臀鳍。尾鳍深叉形。体淡黄色, 背部侧线上有 8 条纵条纹, 背、尾鳍边缘黑色。

分布于中国沿海; 朝鲜南部, 菲律宾, 印度洋及大西洋。




图 317 五指马鲛

## 六指马鲛

马鲛科

*Polynemus sextarius* Bloch et Schneider

背鳍 VIII, I-13; 臀鳍 III-12; 胸鳍 13 + 6; 腹鳍 I-5。侧线鳞 44—48, 5/9—10。

体长 102—148 毫米。体长为体高 2.9—3.5 倍, 为头长 3—5.3 倍。头长为吻长 4.1—6 倍, 为眼径 3.8—4.4 倍。体颇长, 侧扁, 背腹缘均圆钝。头中等大, 前端圆钝。吻短而圆钝, 长度较眼为小, 突出于口前方。眼大, 侧位, 脂膜发达。眼间隔宽阔。下唇较上唇发达, 但不达下唇缝合处。口角超过眼的后缘。上下颌具成带的细牙, 不露出于颌的外侧; 腭部有成带的细牙, 犁骨部无牙。鳃孔大, 鳃盖膜不与峡部相连。头及吻部有鳞, 第二背鳍、臀鳍及尾鳍上有细鳞。侧线发达。第一背鳍起点在胸鳍和腹鳍起点间。第二背鳍起点在臀鳍起点前。胸鳍长, 向后超过腹鳍中部, 有 6 条游离丝

状鳍条。腹鳍不达臀鳍。臀鳍和第二背鳍相对。尾鳍深叉形, 上下叶均尖。身体金黄色, 各鳍淡黄, 侧线前端有一显著黑斑。

分布于南海和东海中国海域; 印度, 斯里兰卡, 泰国, 印度尼西亚及非洲东部各海中。




图 318 六指马鲛