

印度双鳍鲳 双鳍鲳科

*Psenes indicus* (Day)

(叉尾鲳、叉尾)

背鳍 XII, 15; 臀鳍 III-14—15; 胸鳍 20; 腹鳍 I-5; 尾鳍 17。侧线鳞 41—44, 5/17。

体长 78—200 毫米。体长为体高 2—2.3 倍, 为头长 2.9—3.7 倍。体呈卵圆形, 侧扁, 背腹缘皆钝圆。头中等大, 背面圆凸, 头长为吻长 3.4—6 倍, 为眼径 3—3.8 倍。吻钝而短。眼中等大, 侧位, 靠近吻端。眼间隔宽。口小、稍倾斜, 上颌骨后端达眼前缘下方。两颌牙细小, 排列疏松, 呈一行。犁骨、腭骨及舌上无牙。前鳃盖边缘平滑。第一鳃弓上鳃耙细软, 上生有细刺, 鳃耙数 8—9+15—16。食道侧囊内壁为纵长褶壁, 褶壁上具细刺。体被薄圆鳞, 极易脱落, 第二背鳍与臀鳍基底具鳞鞘。侧线完全。背鳍 2, 稍分离。第一背鳍鳍棘弱, 平卧时可收藏于背部沟内。第二背鳍长与臀鳍同形。胸鳍大。腹鳍小, 位于胸鳍基下

方, 可摺迭于腹部浅沟中。尾鳍分叉。体银灰色, 背部色较深。

为热带及亚热带海洋鱼类, 产量不及刺鲳大。供食用。

分布于印度及中国。在我国主要产于南海广东沿海一带以及东海南部。




图 493 印度双鳍鲳

青干金枪鱼 金枪鱼科

*Thunnus tonggol* (Bleeker)

(青干)

背鳍 XIII, 13, 小鳍 9—10; 臀鳍 13—14, 小鳍 8; 胸鳍 32—33; 腹鳍 I-5; 尾鳍 24。

体长 415—670 毫米。体长为体高 3.6—4 倍, 为头长 3.3—3.5 倍。体呈纺锤形, 横断面近圆形; 尾柄细, 中央有一发达隆起嵴, 尾鳍基有二小隆起嵴。头中等大, 圆锥形, 头长为吻长 3—3.2 倍, 为眼径 2.7 倍。眼中等大, 侧上位, 靠近吻端。眼间隔宽。口较大, 上颌骨后端达眼中部下方。两颌具细尖牙一列。犁骨及腭骨具带状细齿。前鳃盖骨边缘平滑。第一鳃弓上鳃耙长稍短于眼径, 鳃耙数 5—6+16—17。体被细小圆鳞, 胸部鳞较大。侧线完全。背鳍 2, 稍分离, 二鳍间距离小于眼径。第一背鳍鳍棘前部长, 向后逐渐减短。第二背鳍与臀鳍同形, 其后有小鳍 9—10 个。臀鳍位于第二背鳍后下方, 其后有小鳍 8 个。胸鳍大, 等于或稍短于头长。腹鳍较小, 腹鳍间突小, 分

2 瓣。尾鳍强, 新月状。体背部蓝褐色, 腹部色较浅。胸腹部有不明显环纹。

为大洋性中上层鱼类, 具皮肤血管系统, 肉赤色, 富脂肪。

分布于太平洋及印度洋热带海区。在我国主要产于南海的海南岛外海, 渔期每年 7 月到 10 月。




图 494 青干金枪鱼