

## 尖头斜齿鲨 真鲨科

*Scoliodon sorrakowah* (Cuvier)

(尖头鲨、尖头曲齿鲛)

体延长,较细小。头很平扁,从吻端至第一鳃孔的背面与腹面几相遇合成一侧突起。尾长比头和躯干稍长,尾基上下方各具一凹洼。吻扁长尖突。眼小,圆形,正侧位,在头侧中央突起,瞬膜发达。鼻孔外侧位,距口端比距吻端近许多,前鼻瓣后部具一细小突起。口深弧形,口宽比口长为小,上下唇褶短小,唇褶见之于口隅处。牙宽扁,边缘无锯齿,齿头外斜,外缘近基底处有一凹缺,2行

在使用,上颌具一正中牙,每侧每行13牙,下颌每侧每行13牙。喷水孔消失。鳃孔5个,中大,最后2个位于胸鳍基底上方。

背鳍2个;第一背鳍中大,起点后于胸鳍里角上方;第二背鳍很小,起点与臀鳍基底后端相对或稍前;尾鳍宽长,下叶前部三角形突出;臀鳍基底颇长,比第二背鳍基底长约大2.5倍;腹鳍短小;胸鳍约与第一背鳍同大,后缘凹入,外角和里角圆钝。

体灰褐色,腹面白色;背鳍、尾鳍、胸鳍灰褐色,臀鳍、腹鳍淡白色。为暖水性中小型鲨鱼。卵胎生。体长一般1米内外。

分布于南海和东海南部与中部(东海北部和黄海罕见)中国海域;印度洋,印度尼西亚。




图 23 尖头斜齿鲨

## 瓦氏斜齿鲨 真鲨科

*Scoliodon walbeehmi* (Bleeker)

(平头、尖头鲨、瓦尔皮曲齿鲛)

体延长,较粗大。头平扁;尾长比头和躯干长稍大,尾基上下方各具一凹洼。吻扁长,钝尖;眼大,圆形,侧位,瞬膜发达;鼻孔外侧位,距口端比距吻端为近,前鼻瓣具一细小突起。口深弧形,口宽比口长为小,上下唇褶都相当发达。牙宽扁,边缘无锯齿,齿头外斜,边缘近基底处有一凹缺,2行在使用。上颌具一正中牙,每侧每行11—12牙,下颌每侧每行12—13牙。喷水孔消失。鳃

孔5个,中大,最后2个位于胸鳍基底上方。

背鳍2个;第一背鳍中大,起点约与胸鳍里角相对;第二背鳍很小,起点与臀鳍基底后端相对或稍前;尾鳍宽长,下叶前部三角形突出;臀鳍基底长比第二背鳍基底长不到2倍;腹鳍比臀鳍稍小;胸鳍约与第一背鳍同大,后缘凹入,外角钝尖,里角圆突。

体灰褐色,腹面白色,有时体侧具少数暗褐色斑点;背鳍和尾鳍边缘暗褐色,臀鳍、腹鳍、胸鳍边缘淡褐色。为暖水性中小型鲨鱼。卵胎生。体长一般1米内外。

分布于南海和东海南部中国海域;红海,印度洋,也见之于日本南部,朝鲜西南部。




图 24 瓦氏斜齿鲨