

黑 鲷 鲷 科

Sparus macrocephalus (Basilewsky)

(海鲋、黑加吉、黑鮓)

背鳍 XI-11—12; 臀鳍 III-8; 胸鳍 18; 腹鳍 I-5; 尾鳍 17。侧线鳞 51—55, 6-8/11-14。

体长 175—295 毫米。体长为体高 2.4—2.6 倍, 为头长 3.2—3.6 倍。体呈长椭圆形, 侧扁。




图 419 黑鲷

头大, 头长为吻长 3.3—3.7 倍, 为眼径 4.5—5.1 倍。眼中等大, 位于头中部靠背方。眼间隔凸起。口较小。上下颌前端有大牙 6 个; 上颌每侧有臼齿 4 行, 下颌每侧有臼齿 3 行。犁骨、腭骨及舌上均无齿。前鳃盖骨边缘平滑。第一鳃弓上鳃耙钝小, 鳃耙数 6—7 + 8—9。体被栉鳞。背鳍棘棘部与棘条部相连, 背鳍棘强大。臀鳍与背鳍棘条部相对, 第二棘棘强大。胸鳍长, 末端达臀鳍起点上方。腹鳍短, 位于胸鳍基下方。尾鳍分叉。全体灰褐色, 腹部色较浅。

沿岸性海产鱼类, 周年可捕获, 供食用, 产量不多。

分布于中国和日本。在我国产于南海、东海及黄、渤海。

黄 鳍 鲷 鲷 科

Sparus latus Houttuyin

(黄脚鮓、交鮓)

背鳍 XI-11; 臀鳍 III-8; 胸鳍 15; 腹鳍 I-5; 尾鳍 17。侧线鳞 45—48, 4-5/11-13。

体长 130—306 毫米。体长为体高 2.4—2.6 倍, 为头长 3.2—3.4 倍。体呈长椭圆形, 侧扁, 背面狭窄, 腹部钝圆。头中等大, 头长为吻长 2.7—3.3 倍, 为眼径 3.8—4.8 倍。吻较尖。眼中等大,




图 420 黄鳍鲷

侧上位。眼间隔宽约等于眼径。左右额骨分离, 平坦无孔隙。口小, 近水平状。两颌前端各具圆锥齿 6 个, 上颌侧方具臼齿 4 列(有时为 5 列); 下颌侧方具臼齿 3 行。犁骨、腭骨及舌上无牙。前鳃盖骨边缘平滑。第一鳃弓上鳃耙短小, 鳃耙数 6—7 + 8—9。体被弱栉鳞, 颊部具鳞 5 行。背鳍与臀鳍基底具鳞鞘。侧线完全。背鳍棘棘部与棘条部相连, 棘棘强, 以第 5 棘棘为最长。臀鳍与背鳍棘条部相对。胸鳍长。腹鳍较小。尾鳍分叉。体背部青灰色, 体侧沿各鳞片具纵灰条纹, 腹鳍、臀鳍及尾鳍下叶呈黄色。液浸标本黄色退去呈灰白色。

为浅海性近岸底栖鱼类, 习见, 供食用, 产量较小。

分布于红海, 印度, 中国, 朝鲜, 日本, 菲律宾。在我国产于东海以及南海沿岸近海。