

东方旗鱼 旗鱼科

Histiophorus orientalis Temminck et Schlegel

(芭蕉旗)

背鳍 XLIV, 8; 臀鳍 8, 11; 胸鳍 17; 腹鳍 2; 尾鳍 12。

体长 1915 毫米。体长为体高 7.7 倍, 为头长 (包括喙状吻部) 2.9 倍。体长呈圆筒形, 稍侧扁。尾柄细, 每侧有 2 个低的隆起脊。头长, 前颌骨与鼻骨向前延长, 构成尖长喙状吻部。眼较小。眼间隔宽。口大, 口裂后缘达眼后缘下方。两颌牙细小, 呈绒毛带状。腭骨具细牙带。舌上亦具绒毛齿。前鳃盖边缘平滑。假鳃发达。第一鳃弓上鳃耙退化。圆鳞板细小, 呈披针状, 埋藏于皮下。侧线完全, 沿体侧几呈直线形。背鳍 2, 2 背

鳍间稍分离。第一背鳍大, 呈芭蕉叶状, 前部背缘稍凹, 后部呈弓状。第二背鳍小与第二臀鳍相对。第一臀鳍较大, 位于第一背鳍末端前下方。胸鳍长呈镰状。腹鳍长于胸鳍由 2 鳍条组成。尾鳍强大, 分叉。体蓝褐色, 体侧有多行白色圆斑点。腹部银白色。第一背鳍褐色, 其上有黑斑点。

为大洋性凶猛鱼类, 游泳迅速。幼鱼与成鱼形态上有变异。

分布于印度尼西亚, 中国, 日本, 夏威夷。在我国产于南海海南岛及西沙群岛。




图 489 东方旗鱼

银鲳 鲳科

Stromateoides argenteus (Euphrasen)

(白昌、镜鱼、平鱼)

背鳍 IX—XII-33—36; 臀鳍 VII—IX-32—35; 胸鳍 21; 尾鳍 17。侧线鳞 94—100。

体长 73—127 毫米。体长为体高 1.3—1.4 倍, 为头长 3.4—4.5 倍。体呈卵圆形, 侧扁, 背腹缘皆呈弧状弯曲。头小, 背面隆凸, 头长为吻长 3.8—5.3 倍, 为眼径 2.6—3.7 倍。吻短。眼较小, 靠近吻端。眼间隔宽。口小, 上颌骨后端达瞳孔前缘下方。两颌齿细小, 排列紧密。犁骨、腭骨及舌上无牙。前鳃骨边缘不游离。鳃盖骨无棘。第一鳃弓上鳃耙细弱, 排列疏松, 鳃耙数 4—6+7—11。食道侧囊内具骨质乳状突起, 上生有细刺, 基部具放射状骨质根。体被细小圆鳞, 鳞片易脱落, 侧线完全, 位高与背缘并行。背鳍与臀鳍同形, 前部鳍条较长, 在幼鱼时其前具小戟状棘, 到成鱼埋于皮下不明显。胸鳍较长。无腹鳍。尾鳍分叉。体背部青灰色, 腹部银白色。各鳍浅灰色。

为名贵食用经济鱼类, 平时栖息外海, 每年于春末游向近海。

分布于印度, 印度及西亚, 中国, 日本, 菲律

宾。在我国沿海均产之。南海和东海多于黄、渤海。




图 490 银鲳