

细鳞鲷 鲷科

Therapon jarbua (Forskål)

(斑猪、海黄蜂)

背鳍 XI-I-10; 臀鳍 III-8; 胸鳍 13; 腹鳍 I-5; 尾鳍 17。侧线鳞 81—90, 15-16/22-23。

体长 97—163 毫米。体长为体高 2.7—3.1 倍, 为头长 3.2—3.5 倍。头中等大, 背部平滑, 头长为吻长 2.6—3.4 倍, 为眼径 3.6—4.4 倍。眼中等大, 眼径等于或稍小于吻长。眶前骨边缘锯齿细。两颌齿内列细小带状, 外列为一行圆锥齿, 排列疏松。犁骨与腭骨具细齿。前鳃盖骨边缘锯齿明显。鳃盖骨下棘强大。上肩胛骨及乌喙骨外露, 边缘具有锯齿。第一鳃弓上鳃耙短小, 鳃耙数 6—9+11—13。体被细栉鳞。背鳍鳍棘部与鳍条部相连, 中间有一深缺刻。背鳍鳍棘发达。臀鳍与背鳍鳍条部相对。胸鳍宽短。腹鳍位于胸鳍基后下方。尾鳍分叉。体背部灰褐色, 腹部色浅。体侧有三条棕褐色弧形纵带。背鳍第 4—7 鳍棘间及第 9—10 鳍棘间各有一黑色斑点。鳍条部亦

有二黑斑。尾鳍上叶尖端黑色, 上下叶中部各有黑色斜条。

为沿岸性热带种类, 可生活于咸淡水, 并可进入河内。

分布于红海, 非洲东岸, 印度, 马来半岛, 中国, 日本, 菲律宾。在我国产于南海以及东海南部。




图 345 细鳞鲷

四带牙鲷 鲷科

Pelates quadrilineatus (Bloch)

(斑猪、海黄蜂)

背鳍 XII-10; 臀鳍 III-10; 胸鳍 12-15; 腹鳍 I-5; 尾鳍 17。侧线鳞 67—73, 12/22。

体长 101—136 毫米。体长为体高 3.1—3.4 倍, 为头长 2.9—3.5 倍。体呈长椭圆形, 侧扁, 背缘狭窄, 腹缘钝圆。头中等大, 头长为吻长 2.8—3.3 倍, 为眼径 3—3.9 倍。眼中等大, 侧上位。眼间隔及后头背部具若干隆起线。眶前骨边缘具细锯齿。两颌牙排列整齐, 牙尖端棕黄色, 上颌牙三列, 下颌牙二列, 外列一行较大。犁骨及腭骨无牙。前鳃盖骨边缘具锯齿。鳃盖骨下棘较大。乌喙骨边缘锯齿细小。第 1 鳃弓上鳃耙细长, 最长鳃耙约与鳃丝等长, 鳃耙 15—18+19—22。体被细栉鳞, 颊部具鳞 5—6 行, 鳃盖上具鳞 7—8 行。侧线完全。背鳍鳍棘部与鳍条部相连, 其间缺刻浅。鳍棘发达。臀鳍与背鳍鳍条部相对。胸鳍等

于吻后头长。腹鳍位于胸鳍基后下方。尾鳍分叉浅。体背部棕灰色, 腹部灰白色, 体侧有 4 条互相平行灰褐色纵带。

为沿岸性鱼类, 可生活于咸淡水或进入河内。

分布于红海, 印度, 菲律宾, 中国, 日本, 大洋洲。在我国主要产于南海以及东海南部。




图 346 四带牙鲷