

## 燕 赤 鲷 鲷 科

*Chelidoperca hirundinacea* Cuvier et Valenciennes

背鳍 X-10;臀鳍 III-6;胸鳍 16;腹鳍 I-5;尾鳍 17。侧线鳞 40—42, 4/10。

体长 146 毫米。体长为体高 3.8 倍,为头长 2.6 倍。体延长,前部稍呈圆柱状,尾柄侧扁。头大,背部圆凸,头长为吻长 4 倍,为眼径 3.6 倍。眼大,侧上位,眼间隔狭。口大,倾斜,下颌稍长于上颌。两颌牙细尖呈带状,上颌前端中央有向后倒牙一丛。犁骨牙呈丛状,腭骨牙呈带状。前鳃盖骨后缘具细锯齿。第一鳃弓上鳃耙细而少,最长鳃耙与鳃丝约等长,鳃耙数 3+7。体被栉鳞,颊部、鳃盖上及后头部皆被鳞。侧线完全。背鳍棘部与鳍条部相连,其间有一浅缺刻。背鳍第 1—3 鳍棘短小,第 4—5 最长。臀鳍与背鳍鳍条部

相对。胸鳍长,末端达臀鳍起点前。腹鳍位于胸鳍基前下方。尾鳍新月形,上叶作丝状延长。生活时体全部赤色。各鳍浅赤色。

为热带海产底栖鱼类,一般生活于较深海处。分布于太平洋西部热带。在我国仅产于南海的北部湾一带。




图 325 燕赤鲷

## 姬 鲷 鲷 科

*Tosana niwae* Smith et Pope

背鳍 X-14;臀鳍 III-7;胸鳍 16;腹鳍 I-5;尾鳍 17。侧线鳞 35, 4/10。

体长 49—81 毫米。体长为体高 3.4—3.7 倍,为头长 2.9—3.7 倍。体延长,侧扁。头中等大,头长为吻长 5.3—6 倍,为眼径 2.8—3.6 倍。眼中等大,眼间隔宽稍凸起。口大,上颌骨后端宽大,被有细栉鳞。两颌齿细小,上下颌前端有二犬牙,闭口时外露,下颌两侧有二钩状牙。犁骨及腭骨具绒毛齿,犁骨齿三角丛状,腭骨齿细带状。前鳃盖后缘有细锯齿。鳃盖骨具 1 扁平棘。第一鳃弓上鳃耙细而密,最长鳃耙长于鳃丝,鳃耙数 10+24。体被小栉鳞,头大部被鳞。侧线完全。背鳍棘部与鳍条部相连,鳍棘较细弱。胸鳍中等大,末端达臀鳍起点上,全部鳍条皆不分枝。背鳍

最后第 11—13 鳍条,臀鳍第 3—5 鳍条,腹鳍第 1—2 鳍条及尾鳍上下叶皆呈丝状延长。全体赤色,无斑点。

海产鱼,呈鲜艳赤色,体小型、比较稀少,无经济价值。

分布于日本,中国。在我国主要产南海的北部湾一带。




图 326 姬鲷