

斑 鱈 科

*Hemirhamphus far* (Forskål)

背鳍II-12; 臀鳍II-10; 胸鳍I-10; 腹鳍I-5; 尾鳍15。侧线鳞46—55。

体长187—258毫米。体长为体高的5.6—6.6倍,为体宽的8.4—9.8倍,为头长的4.2—4.6倍。头长为吻长的2.6—3.1倍,为眼径的3.7—4倍,为眼间隔的3—4倍。体长,侧扁,较高,背缘稍突出,腹缘平坦。体横断面呈长方形。头较长,前方尖锐。眼较大,圆形,侧位而高。鼻孔较小,位于眼的前上方。口中等大,口裂水平。上颌由颌间骨形成三角形,底部较宽。二颌仅于相对部分有牙,牙呈三尖形,犁、腭骨部及舌上无牙。鳃孔宽阔,鳃耙发达弱。

肛门位于臀鳍前方。体被圆鳞,较大。头部仅额顶有大形鳞,余皆裸出。侧线明显,位置低于体下缘。背、臀鳍相对。胸鳍侧位而高。腹鳍腹位,近腹部后方。尾鳍呈叉形,下叶长于上叶。浸制的标本,体淡黄色,背方淡褐色,吻及喙黑色,背鳍前部及尾鳍后缘黑色。体侧有4—9黑褐色横斑。

分布于东海及南海。




图 289 斑鱈

异 鳞 鱈 科

*Zenarchopterus buffoni* (Cuvier et Valenciennes)

背鳍11—12; 臀鳍9—10; 胸鳍9; 腹鳍6, 侧线鳞46—50。

体长96—102毫米。体长为体宽的10—10.4倍,为体高的7—8倍,为头长的3.6—4.2倍。头长为吻长的2.9—3.4倍,为眼径的3.6—4.2倍。体长而侧扁。头较小,前端尖锐。口小,近水平。上颌由颌间骨形成一三角形板,宽大于长。下颌突出,延长成一扁平针状喙。两颌仅相对部具牙,牙为圆锥形,犁、腭骨部及舌部无牙。鳃耙发达,鳃盖膜分离不与峡部相连。肛门紧位于臀鳍前方。体被较大圆鳞,易脱落,头上仅上颌三角部及额顶具鳞,余皆裸露,体背鳞片排列有两个方向,交叉于体二分之一的地方,在

交叉点上具一圆形鳞,复于两交叉点上。侧线鳞圆形、明显,侧线位置低,近体侧下缘,侧线于喉部有一分枝,达胸鳍基部。背鳍较长,约为臀鳍基部的3倍,位于身体的较后方,与臀鳍相对。胸鳍侧位而高。腹鳍短小。尾鳍钝圆形。浸制的标本,体背呈淡灰褐色,腹部淡白色。

分布于南海。




图 290 异鳞鱈