

白尾鹞 隼形目 鹰科

Circus cyaneus cyaneus (Linnaeus)

(灰鹰[北名]、白抓[北名]、灰鹞、鸡鸞)

英名: Hen Harrier; 量度: 全长约 480, 嘴峰 26, 翅 354, 尾 225, 跗蹠 73 毫米(♂)。


形态 上体包括两翅的表面大都蓝灰色; 后头缀以褐色, 羽基的白色亦常展露于外; 尾上覆羽白色; 外侧飞羽黑褐; 中央一对尾羽与背同色, 次二对亦灰而具暗灰横斑, 外侧尾羽大都白色, 亦杂以灰暗横斑。耳部后面、下面以至于颈的羽毛蓬松而稍卷曲, 略成脸盘状, 但不如鹞类之显著。胸与头同但较淡, 向后渐转为纯白色。雌鸟上体大都暗褐色; 头、颈各羽缘以棕黄色, 翅上覆羽和下背亦缀以棕斑; 外侧飞羽具有较黑的横斑; 尾上覆羽白色; 尾羽中央一对灰褐, 外侧者棕黄, 均贯以黑褐色横斑。额基和眼周均为棕白色; 脸盘与头同色。下体棕黄而杂以棕褐色纵纹, 向后纵纹渐细并转为棕红色, 且分布亦较疏。眼黄; 嘴黑, 基部带蓝, 蜡膜绿黄; 脚和趾均黄, 爪黑。

生态 这是开阔田野上的一种猛禽。飞行轻捷, 常低飞掠过平原, 稍停即直扑地面草丛间抓着猎物为食。嗜食鹌、鸫等小形禽鸟, 亦吃昆虫、田

鼠及其他动物。栖息在地面, 不栖于树上。

分布 繁殖在我国东北和新疆西部; 遍布全国境内, 为旅鸟和冬候鸟。

经济意义 嗜吃害虫, 小型啮齿动物和小鸟等, 也常盗吃鸟卵, 因而认为是一种益害参半的鸟类。



鹞 隼形目 鹰科

Circus melanoleucus (Pennant)

(黑白花鸞、喜鹞鹰[北名]、客鹞鹞[南名])

英名: Pied Harrier; 量度: 全长约 430, 嘴峰 25, 翅 340, 尾 196, 跗蹠 72 毫米(♂)。

形态 头、颈、胸、背、肩以及翼上的中覆羽和外侧 6 枚飞羽均黑; 翅上余羽、较长的肩羽、腰和尾等大都银灰色, 羽缘常沾褐色; 尾上覆羽白而缀以灰斑; 下体余部纯白。

雌鸟较雄鸟为大, 黑色部分变为暗褐, 头羽缀以棕白缘, 尾灰而具黑褐色横斑, 下体白而杂以黑褐色纵纹。

眼黄; 嘴黑, 基部带蓝, 蜡膜绿黄; 脚和趾橙黄色, 爪黑。

生态 习性与其他鹞类同, 常遇见于近水的泽地和草原, 嗜吃蛙、蜥蜴、小鸟和昆虫等。

分布 繁殖在东北; 迁徙时, 见于沿海地区及

西南各省。

经济意义 与白尾鹞同。

