


星头啄木鸟

䴕形目 啄木鸟科

Dendrocopos canicapillus scintilliceps (Swinhoe)

(星斑头啄木鸟、小䴕、火点嘴打木[北名],一点红)

英名: Grey-crowned Pigmy Woodpecker; 量度:
全长, ♂170, ♀175; 嘴峰, ♂17, ♀18; 翅, ♂100,
♀101; 尾, ♂63, ♀66; 跗蹠, ♂16, ♀16 毫米。



$\times \frac{2}{5}$

形态 额和头顶灰色; 眼先污白色。眉纹白, 向后直伸至颈侧, 在此形成块斑状; 颊和耳羽淡褐色; 耳羽后面的一块斑、后头、后颈、上背、肩及尾上覆羽均黑; 后头两侧各有一个深红色的小纵纹, 若火花状, 故名“星头啄木鸟”。中背、下背及腰均白色, 后二部并杂以黑色横斑。翅黑, 飞羽两翈均杂以白色细斑, 内侧飞羽的白斑相并, 形成一大斑; 中、大覆羽白斑亦著。颤纹褐灰色。颈和喉污灰白色; 下体余部棕白或淡棕褐色, 胸和两肋杂以黑褐色狭细羽干斑, 向后渐不显著。

雌鸟相似, 但后头无红纹。

眼红色; 嘴暗铅色; 脚暗红褐色。

生态 栖息地与大斑啄木鸟相似, 但较罕见。鸣声亦相似, 却不如后一种之尖锐。飞行迅速, 常成对飞行。食物以虫为主。巢如其他啄木鸟一样, 亦营于树洞里。在昌黎山地曾经见有一巢营于杏树的树洞中, 洞口距地面仅 8.6 分米。

分布 此鸟分布从东北以至云南, 而分化为 8 个亚种。本亚种留居在华北一带; 留居在华南的为 *D. c. nagamichii*。

经济意义 与其他啄木鸟同。


黑枕绿啄木鸟

䴕形目 啄木鸟科

Picus canus zimmermanni Reichenow

(香嘴打木[北名], 黄啄木[南名], 火老鸦、山啄木、山䴕)

英名: Black-naped Green Woodpecker; 量度:



$\times \frac{1}{3}$

全长, ♂295, ♀290; 嘴峰, ♂38, ♀36; 翅, ♂141, ♀143; 尾, ♂102, ♀108; 跗蹠, ♂26, ♀26.5 毫米。

形态 额和头顶前部辉红玉色; 眼先和颤纹均黑; 头和颈的余部灰色。背淡灰绿色; 腰和尾上覆羽绿黄色。尾羽的羽干坚硬如棘, 呈黑褐色; 中央尾羽暗褐色, 而具多数灰白色横斑; 外侧尾羽转为纯褐色, 横斑不著。翅上覆羽与背几相同色, 飞羽大都暗褐, 并于外翈具有白色斑点; 内侧飞羽的外翈全面渲染着黄褐色, 白斑因亦不著。下体概灰色; 至秋换新羽时, 自胸以次呈绿灰色。

雌鸟头上无红斑。

眼淡珠红色; 嘴黑褐带绿色, 嘴基略沾黄绿色; 脚褐绿色。

生态 常见于山地以及近山的园地, 栖于森林、丛薮、路旁的树木间。鸣声似“hsu—hsu—hsu—hsu”, 一度四声以至七声; 每分钟直叫 5—6 次。攀树索虫, 犹如大斑啄木鸟一般, 但亦在地上觅食。所食的, 除昆虫外, 还有浆果和其他植物物质东西。巢营于树洞里。曾于 1954 年 5 月间在河北省昌黎山上杏树的树洞里发现一巢, 洞口距地仅 1.8 米。亲鸟取蚁以喂雏鸟。

分布 迄今所知, 在我国范围内有 9 个亚种, 除新疆、西藏外, 遍布全国。上面所述的亚种见于我国东北及河北的东北部; 华东常见的亚种为 *P. c. guerini*, 华南的为 *P. c. sobrinus*。