

白背啄木鸟

鸛形目 啄木鸟科

Dendrocopos leucotos sinicus (Buturlin)

英名: White-backed Woodpecker; 量度: 全长, ♂, ♀ 260; 嘴峰, ♂ 38, ♀ 34; 翅, ♂, ♀ 141; 尾, ♂ 94, ♀ 92; 跗蹠, ♂ 25, ♀ 23 毫米。

形态 额、眼先、眉纹、颊、耳羽等均棕白色; 头顶及后头深红色; 后颈、上背、腰及尾上覆羽等黑色; 下背白, 而微杂以黑色, 在前略成横斑状。中央二对尾羽纯黑; 第三对黑, 羽端部分缀以棕白色点斑和横斑; 外侧尾羽基部黑, 其余大部分白色而具有黑斑。肩羽黑, 羽端杂以白色。两翅的飞羽和覆羽均黑, 中与大覆羽以及飞羽均具白色斑点, 相并而成数道横斑。颊及喉白色; 颧纹黑, 向后直伸至胸侧, 另分一支向上接连于后头。胸、上腹及两肋白, 而杂以黑色纵纹; 下腹以至尾下覆羽呈浓淡不一的朱红色, 前者具有黑色斑点。

雌鸟相似, 但头上无红色, 而纯为黑色。


眼红色; 嘴暗角色; 脚和趾暗灰褐色。

生态 与大斑啄木鸟相似。栖于 500—1,000 米的山地。营巢习性未悉, 但依福建另一亚种白背啄木鸟的观察, 与一般啄木鸟亦同, 洞口距地甚高。

分布 国内白背啄木鸟有 4 个亚种, 分布于

东北、内蒙古、河北、福建及台湾。本亚种主要栖息于河北的东陵, 内蒙古亦曾有过记载。近又于四川发现一新亚种, 命名为 *D. l. tangi* Cheng。

经济意义 与大斑啄木鸟略同。



棕腹啄木鸟

鸛形目 啄木鸟科

Dendrocopos hyperythrus subrufinus (Cabanis et Heine)

(横花背啄打木[北名])

英名: Rufous-bellied Pied Woodpecker; 量度: 全长, ♂ 220, ♀ 215; 嘴峰 ♂ 25.5, ♀ 25; 翅, ♂ 123, ♀ 130; 尾, ♂ 84, ♀ 80; 跗蹠, ♂ 20, ♀ 21 毫米。

形态 额、眼先、头侧及颊等均白; 颧纹黑, 而杂以灰白色; 头顶至颈部辉深红色。背和两肩黑, 而贯以多数白色横斑; 腰、尾上覆羽以及中央尾羽均黑色; 外侧尾羽呈黑白横斑相杂状。两翅大都黑色, 覆羽与飞羽均缀以白色斑点。耳羽、颈侧、喉以至腹部均棕褐色; 肛周和尾下覆羽深红色。

雌鸟的头顶以至顶部均黑, 而密布以白色细斑。

眼红玉色。上嘴黑而沾绿, 下嘴黄角色, 雌鸟并着绿色光泽, 尤其在嘴基。脚和趾暗铅色。

生态 与大斑啄木鸟略同, 但大都获见于山林间。性隐怯, 不很鸣叫。

分布 繁殖于东北, 迁徙经河北、山东、湖北、四川等地, 而至广西和云南。

经济意义 与大斑啄木鸟略同。

