


黑啄木鸟 鸢形目 啄木鸟科

Dryocopus martius martius (Linnaeus)



英名: Black Woodpecker; 量度: 全长约 475, 嘴峰, ♂ 60, ♀ 56.5; 翅, ♂ 250, ♀ 249; 尾, ♂ 187, ♀ 183; 跗蹠, ♂ ♀ 35 毫米。

形态 为啄木鸟类中最大的一种。全体纯黑色, 头侧特亮, 两翅的飞羽及颈、喉等稍着褐色。雄鸟头的上部从额至后头概深红色, 雌鸟的红色仅限于后头。

眼淡黄色; 嘴峰浅蓝, 先端变黑; 脚和趾深褐灰色。

生态 栖于山地松林或桦木林间。从前在河北东陵捕获很多, 近来随着森林的采伐, 而渐减少。

分布 国内有 2 个亚种: 本亚种见于东北、内蒙古以至河北、山西; 另一亚种则遍布从甘肃西北部、青海, 以至西藏昌都地区和云南西部。

经济意义 啄食树干中的害虫, 有益。

大斑啄木鸟 鸢形目 啄木鸟科

Dendrocopos major cabanisi (Malherbe)

(花啄木、臭嘴打木、花嘴打木[北名], 白花啄木[南名])

英名: Greater Pied Woodpecker; 量度: 全长, ♂ 230, ♀ 220; 嘴峰, ♂ 29, ♀ 28; 翅, ♂ ♀ 129; 尾, ♂ 81, ♀ 84; 跗蹠, ♂ ♀ 22 毫米。

形态 额、眼先、颊、眉和颈侧等均白; 自额至颊或渲染淡茶褐色; 耳羽亦茶褐色; 后头辉红; 头



顶以至尾部表面概黑; 外侧尾羽的端部杂以白斑, 最外侧尾羽大都白色, 而具黑色横斑。两翅黑色, 内侧覆羽纵贯以一道白纹, 飞羽横贯以数条白斑。鹳纹黑, 后达至胸侧。下体淡茶褐色, 下腹中央以至尾下覆羽均辉红色。雌鸟后头纯黑, 无红斑。

眼暗红色; 嘴黑铅色; 脚和趾均暗红褐色。

生态 常见于山地和平原的园圃、树丛及森林间, 为啄木鸟类中最常见的一种。脚强, 趾四个: 其中二个向前, 二个向后, 各趾的趾端均具有锐利的爪, 巧于攀登树木。尾羽的羽干, 刚硬如棘, 能以其尖端撑住树干上。助脚支持体重并攀木。嘴强直如凿。舌细长, 能伸缩自如, 先端并列生短钩。攀木觅食时, 以嘴叩树, 笃笃作声, 且一连叩好几下, 叩得非常快, 好象击鼓一般。察出有虫时, 就啄破树皮, 以舌探入, 而钩取害虫为食。索食时, 从树干下方, 依螺旋式而渐攀登至上方。鸣声尖锐, 略以“《×ㄥ, 《×ㄥ, 《×ㄥ……”或“<| -|, <| -|……”, 常且飞且鸣。巢营于树洞中。曾在昌黎山地的杏树上发现一巢洞, 距地约 4 米。

分布 几遍全国, 迄今所知, 有 8 个亚种。本亚种分布于华北的东部; 在华南为另一亚种 *D. m. mandarinus*。

经济意义 啄食树干中的害虫, 如天牛幼虫和蠹虫等, 为益甚著, 尤其是这些害虫钻在树干里, 难于消灭, 所以啄木鸟所起的有益作用更加重要。但啄木鸟在啄虫时, 常凿破树皮, 使易感染病害, 也有害处。