


红胸啄花鸟 啄花鸟科

Dicaeum ignipectus ignipectus (Blyth)

英名: Fire-breasted Flowerpecker; 量度: 全长约 80, 嘴峰 7—8, 翅 47—50, 尾 24—27, 跗蹠 11—12 毫米 (♂)。

形态 上体包括两翅及尾等概黑而有强烈的蓝绿色金属光辉; 下体浅棕黄, 两胁着染橄榄绿



$\times \frac{3}{4}$

色; 胸部具有朱红色块斑, 其下还有黑色块斑, 后者有时还延及腹部中央。

雌鸟上体橄榄绿色, 下体大致浅棕黄色。

眼褐色; 嘴黑色; 脚暗褐色。

生态 栖息在阔叶或附有寄生植物的树丛中。平时单独或成对, 有时结成小群在高树顶处活动, 连续作“tic-tic”的叫声。嗜吃花芽、浆果、昆虫、蜘蛛, 亦喜摄食槲寄生果中的粘质物。繁殖在 3—6 月间。巢营于山谷密林中的树上, 呈卵圆形, 以植物纤维为构架, 里面铺以木棉、蛛丝、苔藓之类。卵每产 2—3 枚, 色纯白。

分布 主要分布在我国南部, 西达四川和云南, 东至广东和福建; 在台湾产有另一近似亚种。


经济意义 与朱背啄花鸟相似, 可饲供笼鸟用。此外, 此鸟常活动于花朵上, 也有助于传播花粉。

蓝喉太阳鸟 太阳鸟科

Aethopyga gouldiae dabryii (Verreaux)

(黄背太阳鸟)

英名: Blue-throated Sunbird; 量度: 全长约 135, 嘴峰 14—15, 翅 53—55, 中央尾羽 70—72, 外侧尾羽 38—40, 跗蹠 14 毫米 (♂)。



$\times \frac{1}{2}$

形态 额、头顶、颊、喉部中央、耳羽的后部以及胸侧的块斑等均呈金属紫蓝色; 眉纹、后颈、颈侧和翕部深红; 腰鲜黄; 尾上覆羽和非常延长的中央尾羽基部三分之二也呈金属紫蓝色; 中央尾羽的先端三分之一和其余尾羽黑褐色; 飞羽黑褐色, 外缘橄榄绿; 胸和上腹呈鲜红色, 下体余部绿黄色。

雌鸟上体橄榄绿, 腰部黄色较雄鸟为淡; 两翅和尾黑褐, 羽缘暗黄褐色; 下体前为灰绿, 向后转为黄绿色; 中央尾羽不延长。

眼深褐; 嘴和脚均黑褐色。

生态 生活于高山茂林中, 不到平原。性怯, 行动轻捷。主要以花蜜、昆虫等为食。觅食时, 在树叶丛里往来飞跃, 姿态优美。叫声尖锐而带颤音。繁殖在 5—6 月间, 用植物纤维、草茎和苔藓之类构成椭圆形巢。卵每产 2—3 枚, 呈乳白色而疏具淡紫褐色斑点。

分布 自陕西南部以南的西南各省, 东抵两湖, 西至西藏东南部。

经济意义 羽色非常艳丽, 可利用为观赏鸟。