


## 黑背燕尾 鹟科 鸫亚科

### *Enicurus leschenaulti sinensis* Gould

(黑背歧尾鸟、溪精、黑背溪精)

英名: White-crowned Forktail; 量度: 全长约 280, 嘴峰 27, 翅 110, 尾 152, 跗蹠 30 毫米(♂)。

**形态** 额和头顶前部白; 头的余部、颈、胸、上背及两肩均黑, 两翅黑褐, 横贯以一宽阔的白色带斑, 三级飞羽的羽端亦缀白; 最外侧二对尾羽纯白; 其余尾羽黑, 而且白色羽基和羽端; 下背、腰、



$\times \frac{1}{4}$

尾上覆羽以及下体自胸以下均白色。

雌鸟相似, 但黑色较浅, 头顶及飞羽均为黑褐色。

眼暗褐; 嘴黑; 脚和趾多淡肉色。

**生态** 栖于多林的山地, 常在溪谷及急流附近活动, 觅食水生昆虫。若受惊扰, 立即直飞匿入岸旁的荫蔽绿丛中, 同时并连续发出宏亮而短促的“tsee——”声, 尖锐如箫。雄鸟在繁殖期中还能啾鸣。巢以苔藓、细草、卷须等构成杯状, 内铺以残叶, 置于瀑布附近的岩隙间或石栅下, 常甚隐蔽, 不易获见。巢壁外敷的苔藓, 因常稍湿, 仍长得很丰满, 而构成鲜绿一层。卵每窝通常 4 枚, 呈浅黄橙色, 而布满红紫色块斑, 其上更杂以浓淡不等的砖红色细点。

**分布** 遍布我国南部山地, 西抵四川和云南的西部。

**经济意义** 与小燕尾同。


## 黑喉石鹟 鹟科 鸫亚科

### *Saxicola torquata stejnegeri* (Parrot)

(野鹟、石栖鸟、谷尾鸟)

英名: Stonechat; 量度: 全长约 140, 嘴峰 10.5, 翅 70, 尾 52, 跗蹠 21 毫米(♂)。

**形态** 上体自额至腰, 以及头侧和颈、喉等概黑, 背与肩杂以棕色羽缘, 至腰羽则转为白色; 尾上覆羽白色沾棕; 尾羽黑色; 两翅大都黑褐, 羽缘沾棕, 内侧覆羽白, 形成一显著翼斑; 颈和上胸两侧白; 胸的余部棕栗, 向后渐淡, 转为棕白色。



$\times \frac{1}{2}$

雌鸟上体大都黑褐, 各羽缘以棕色; 尾上覆羽及翅上的白斑均沾棕色; 颈侧及颈、喉等淡棕色。余羽与雄相似。

眼暗褐; 嘴及脚、趾等均黑。

**生态** 常栖于田地谷物的梢端或矮树、灌木的高处, 亦落在岩石上, 但往往在明显易见的地方。性活跃, 栖在树顶时, 常见它不时急扭或展开其尾部。遇有虫类飞过, 即突然飞出捕捉, 后复返栖原处, 犹如鸫类一般。食物绝大部分为昆虫, 以蚱蜢为最多, 主要的有沟金针虫、金龟蚬、象蚬等及其幼虫(蛴螬), 但还兼吃些蜘蛛和杂草种子等。巢以杂草、苔藓、细根等构成杯状, 置于地上, 大多在石下或丛灌下面, 或在洞隙间。卵每产 4—6 枚, 呈苍蓝色而布满着淡红褐细点, 尤其在卵的纯端, 有时并成环状或帽状。

**分布** 此鸟遍布全国, 有 4 个不同的亚种; 本亚种繁殖在我国东北及内蒙古, 迁经我国东部, 而至南部过冬。

**经济意义** 嗜吃不少害虫, 于农有益。