

栗头蜂虎

佛法僧目 蜂虎科

Merops viridis viridis Linnaeus

(食蜂鸟[南名])



英名: Blue-throated Bee-eater; 量度: 全长 255, 嘴峰 38, 尾 112, 跗蹠 10 毫米(♂)。

形态 自额至上背概紫栗色, 下背至尾上覆羽淡蓝色; 中央尾羽深蓝, 而具褐色羽干, 其较狭而突出的先端近白, 末端缀蓝; 外侧尾羽的内翎黑褐, 外翎亦呈深蓝色; 肩羽及两翅表面悉呈辉浓绿色, 最内侧飞羽带蓝, 其余飞羽均具黑褐色羽干和先端; 眼先、眼的下方和耳羽概黑色; 颈和喉蓝色, 在颈较淡; 胸呈辉绿色, 向后渐淡而近白, 两肋杂以褐色; 腋羽和翅下覆羽深棕色。

眼红; 嘴黑; 脚和趾黑色。

生态 栖息于乡村附近的丘陵或林地, 觅食昆虫, 尤嗜蜂类, 故有“蜂虎”的名称。飞行轻捷, 常结小群作半圈状滑翔, 并在飞时捕虫为食, 有时亦由栖止处急速突出, 捕取猎物。鸣声为尖锐而延长的颤音, 常在翔飞时高叫不已。巢常营于山地坟墓的隧道中。

分布 夏时见于我国南部大陆, 自福建西抵云南; 在广东海南岛终年可见。

经济意义 嗜吃昆虫, 特别是白飞蚁等, 有相当益处; 但不利于养蜂业。

三宝鸟

佛法僧目 佛法僧科

Eurystomus orientalis calonyx Sharpe

(老鸱翠、东方宽嘴转鸟)



英名: Broad-billed Roller; 量度: 全长 270; 嘴峰, ♂ 26, ♀ 27; 翅, ♂ 191, ♀ 185; 尾, ♂ 96, ♀ 95; 跗蹠, ♂ ♀ 18 毫米。

形态 头形大, 头顶稍平。头和颈均黑褐色。背面几乎纯暗蓝绿色。两翼的覆羽大都与背同色, 但较鲜亮, 而蓝色更著。飞羽和初级飞羽均黑, 其位于外侧者的外翎略着蓝色; 初级飞羽在近羽基处, 具有一道宽阔蓝白色横斑, 飞时尤显。尾黑, 略沾蓝色光泽, 羽基与背部几相同色。颈和喉的中部具有钴蓝色羽干斑。下体余部包括腰羽和下覆羽, 均纯蓝绿色, 向后略淡。雌雄相似。

眼黑褐色。嘴朱红, 上嘴先端黑色; 嘴基特形宽阔。脚亦朱红, 爪黑。

生态 此鸟夏时常见横飞空中, 捕虫为食。飞时左右颠簸不定, 易于识别。栖于树枝上, 远望其羽色, 好象鸚鵡之类。鸣声粗厉, 略似“Ka-Ka-Kah……”常一连急叫几声, 很远就可以听到。不自营巢, 卵产于距地甚高的树洞里或鸛巢中。曾在昌黎见此鸟与红脚隼争夺鸛巢, 后者竟被赶走。

分布 夏时遍布自东北, 西至甘肃, 南至云南; 在长江以南地区比较常见, 广东沿海一带终年留居。

经济意义 嗜吃害虫, 对农、林有很大益处。