

灰 背 隼 隼形目 隼科

Falco columbarius insignis (Clark)


(鸿隼、朵子、冷朵子[北名]、灰鹞子[南名])

英名: Merlin; 量度: 长约 280, 嘴峰 15, 翅 202, 尾 130, 跗蹠 34 毫米(σ^{α})。

形态 上体包括两翅和尾等的表面概蓝灰色, 各羽缀以黑色羽干, 头上更明显; 后颈具一道棕色领圈, 亦杂以黑斑; 尾羽先端淡灰或白, 并具宽阔近端黑带; 飞羽黑褐, 外翈缀以灰色点, 内翈具白色横斑。额、眼先、眉纹、头和颈的两侧以及下体均近白沾棕, 头和颈的两侧杂以细纹; 胸、腹与两胁布满棕褐色粗纹, 中贯以黑色羽干; 腿羽深棕, 微缀以黑纹。未成长的雌鸟上体暗褐带灰, 并满杂以棕色横斑; 翅和尾大都相似, 但褐色转黑; 头顶棕褐色, 密缀以黑色细纹; 领圈如在雄鸟一般。下体亦似雄鸟, 但褐纹较密而粗。眼暗褐色; 嘴暗蓝, 先端黑; 蜡膜和脚均黄; 爪黑。

生态 遍布于我国东部一带, 为旅鸟和冬候鸟。

经济意义 与燕隼略同。



$\times \frac{1}{4}$

红 脚 隼 隼形目 隼科

Falco vespertinus amurensis Radde

(青鹰、红腿鸿隼、青燕子、蚂蚱鹰[北名]、白指甲鹞[南名])

英名: Red-legged Falcon; 量度: 全长约 290, 嘴峰 17, 翅 230, 尾 140, 跗蹠 28 毫米(σ^{α})。

形态 上体概石板灰色, 自额以至上背和小覆羽等特形暗浓。初级飞羽的先端稍黑。颈侧以及下体概与上体同色, 但较淡。肛周、尾下覆羽和两腿均棕红色。故有红脚隼的名称。腋羽和翼下覆羽纯白。雌鸟上体包括两翅的内侧覆羽和尾羽, 大都暗灰色, 头羽较浓而且黑褐色羽干纹, 余部以及尾羽均杂以黑褐色横斑; 飞羽黑褐, 内翈缀以一系列平行的白斑。颈、喉和颈侧均白沾棕, 喉与颈侧间略具黑灰色鹤纹。下体自胸以次棕白, 满布黑褐色纵纹, 向后渐细; 肛周、尾下覆羽以及两腿棕黄色; 腋羽和翅下覆羽白而具黑斑。眼暗褐色; 嘴黄, 基部较淡, 先端转黑, 蜡膜、脚和趾橙黄; 爪淡肉黄色。

生态 常见高翔在开阔田野及山麓一带, 直至近黄昏时, 觅食蝼蛄、蝗虫等。迁徙常结群。通常不自营巢, 而占用鹊巢产卵。

分布 夏时遍布我国东北及华北一带; 迁徙经湖南、福建、广东等省以至印度、非洲东部越冬。

经济意义 嗜吃蝗虫、蝼蛄等主要害虫, 益处很大。



$\times \frac{1}{6}$