

游隼 隼形目 隼科

Falco peregrinus Tunstall

(花梨鹰、鸭鹞[北名]、鸭虎[北名]、黑背花梨鸭[南名])

英名: Peregrine Falcon; 量度: 全长约 410, 嘴峰 26, 翅 314, 尾 160, 跗蹠 50 毫米(♂)。

形态 头顶、后颈、头和颈的两侧以及形短的



$\times \frac{1}{7}$

髭纹概黑沾蓝、头羽各贯以黑纹, 上体余部包括两翅的内侧覆羽呈灰蓝色, 各羽纵贯以黑褐色羽干, 并微具暗褐色横斑; 飞羽黑褐, 内翎亦杂以灰白缀黑的横斑; 尾呈灰蓝与黑色相杂的横斑。下体在前纯白沾棕; 腹羽缀以具有矛头状的细纹, 至两胁和尾下覆羽转为黑斑, 横斑在羽干处亦略伸成矛头状。眼褐色; 脸和蜡膜黄; 嘴灰蓝色, 基部带黄绿色; 脚和趾均橙黄, 爪黑。

生态 为隼类中较大的一种。性凶猛, 能捕捉比较大形的鸟类如野鸭等为食, 故北方通称鸭虎。飞行迅速若矢, 首先搏翼几下, 而后平张两翅一劲滑翔直往, 未见它再翔返到曾经飞过的地方。繁殖在北方。

分布 国内有几个亚种, 见于我国东部各省, 在北方为旅鸟, 南方为冬候鸟。

经济意义 嗜吃各种野鸭和其他中等大小的鸟类及小型兽类。放鹰者常饲它供狩猎用。

燕隼 隼形目 隼科

Falco subbuteo streichi Hartert et Neumann

(青条子、土鹞、儿隼、蚂蚱鹰[北名]、虫鹞[南名])

英名: Hobby; 量度: 全长约 315, 嘴峰 18, 翅 251, 尾 136, 跗蹠 30 毫米(♀)。

形态 头顶、头侧、后颈和髭纹均灰黑; 额基、眼先的前部及后颈上一道半隐不显的领斑均乳白色; 上体余部灰色, 至尾转淡, 各羽悉具黑褐色羽干, 外侧尾羽满具黑斑; 飞羽暗黑, 内翎缀以棕斑。下体至腹棕白, 胸、腹和两胁密杂以黑褐色纵纹; 肛周、两腿及尾下覆羽锈红色, 有时稍杂以黑纹。眼暗褐色; 嘴暗灰, 先端近黑; 蜡膜和脸皮暗绿黄; 脚和趾黄色; 爪黑。

生态 常见于林地或栽培地区的丛树间。形态略似红隼, 但翅较长而似镰刀, 尾亦较短。飞行轻捷迅速, 而不似红隼之常停翔于空中。常在飞行时捕取飞虫以至小形禽鸟等为食。飞得相当快的鸟如燕子等, 也难幸免。觅食大都在清晨及黄昏间。卵产于鸢、鹞、或鸦等的旧巢中。

分布 遍布我国东部, 在黄河、长江流域为夏候鸟, 在广东为留鸟。

经济意义 嗜吃害虫和益鸟, 益害参半, 常被饲放狩猎用, 以帮助消灭害虫。



$\times \frac{1}{7}$