

红嘴相思鸟 鹟科 画眉亚科

Leiothrix lutea lutea (Scopoli)

(相思鸟、红嘴玉[南名],红嘴绿观音[川名])

英名: Red-billed Leiothrix, Beijing Robin (商名); 量度: 全长约 150, 嘴峰 13, 翅 68, 尾 58, 跗蹠 25 毫米(♂)。

形态 额、头顶及后颈等均为带黄的橄榄绿色; 上体余部包括翅上的覆羽和三级飞羽转为灰橄榄绿色; 尾上覆羽较暗, 而具白色狭端; 次级和初级飞羽黑, 而外缘以赤红和棕黄色; 中央尾羽基部橄榄绿, 端部呈绒黑色; 外侧尾羽内翹暗褐, 外翹和先端亦为辉黑。眼先和眼圈黄白; 颧纹暗橄榄绿; 耳羽淡灰绿; 颊和喉均辉黄; 胸橙红; 腹和尾下覆羽均绿黄, 后者黄色较浓; 两胁橄榄灰色。

雌鸟羽色较钝, 特别是胸部的橙红色。

眼暗褐; 嘴赤红(♂)或暗红(♀), 基部转黑; 脚和趾等黄褐或绿黄色。


生态 常栖居林中灌木丛间或成片的竹林中, 夏在高山, 冬迁低山及山脚一带。喜结群活动, 雌雄形影不离。叫声响亮, 似“tee-tee-tee-tee”。在繁殖中, 雄鸟还能啭鸣, 音调多变, 非常动听。鸣时常高踞灌丛顶处, 振翅耸羽, 状甚激昂活跃。性杂食, 兼吃昆虫和植物种子等。巢呈深杯状, 以竹叶、茅草、苔藓等构成, 置于草丛或矮灌间。卵每产 3—5 枚, 呈绿白以至浅绿蓝色, 并缀以灰色和淡

紫色粗斑, 其上更散有赭色、褐色或焦黄细点。

分布 遍于秦岭以南的大陆, 主要均属于本亚种。

经济意义 这是驰名国内外的观赏鸟。近年来运销国外, 数量每年以万计, 但应防止滥捕, 特别在其繁殖期中。同时还可以开展专类饲养工作, 使大量繁殖, 以供需要。

附注: 此鸟常被香港商人称为“Beijing Robin” (意即北京鹟), 因外国人喜爱喜于歌咏的鹟鸟, 把此鹟命名为“北京鹟”, 有利于赚钱。实则此鸟并非鹟鸟, 也不产于北京。



红翅鵙鹟 鹟科 画眉亚科

Pteruthius flaviscapis yunnanensis Ticehurst

(伯劳眉、山鵙鹟、大赛[南名])

英名: Red-winged Shrike Babbler; 量度: 全长约 165, 嘴峰 17, 翅 82, 尾 61, 跗蹠 27 毫米(♂)。

形态 额、头顶、后头、眼先、颊及耳羽等均黑; 眉纹白; 上体余部蓝灰, 有些尾上覆羽具有黑端; 尾羽及翅上覆羽呈亮黑色; 初级飞羽和外侧次级飞羽黑褐, 各羽外缘以亮黑色, 末端转白; 内侧次级飞羽大都栗色, 外翹基部转黄, 羽端缀黑; 下体大都珠灰, 下胁沾玫瑰红色, 腹部中央以至尾下覆羽纯白。

雌鸟的头侧灰褐; 上体余部橄榄褐; 两翼大都黑褐, 大覆羽和飞羽均具绿色外缘, 内侧次级飞羽纯绿而具栗端, 初级飞羽却具白端; 中央尾羽绿而具黑端; 外侧尾羽亦绿, 但端部转黑而具微黄末端; 眉纹不显; 头侧及颊等淡灰; 胸以下均棕色, 腹部中央棕白。

眼暗褐; 上嘴黑, 下嘴铅灰; 脚肉白以至淡肉褐色。

生态 夏栖高山, 冬迁至低山及山脚一带。平常成对或结小群在林缘丛灌及矮树间活动, 主要在主干上徐缓跳跃攀登并找吃, 亦常跃至附近的侧枝上、栖于灌丛巅处时, 张目俯瞰, 外貌泰然, 极其伯劳, 故称它为“鵙鹟”。性不很畏人; 即有人走近, 仍高叫不已。叫声似“tiup-tiup-tiup——”。食

物以昆虫为主, 所吃的昆虫以鳞翅目昆虫为最多。巢以卷须、细根等构成杯状, 外敷以蛛网、苔藓等, 悬于枝梢分叉处。卵每产 3—4 枚, 呈白色, 而具有稍缀以褐点的灰斑。

分布 本亚种见于云南; 另有其他亚种分布于西藏昌都及四川和南部沿海各省。近在广东海南岛又发现一个短翅的新亚种, 命名为 *P. f. ling-shuiensis* Cheng。

经济意义 嗜吃害虫, 是一种山林中的益鸟。

