

蓝 歌 鸲 鸲科 鸲亚科

Luscinia cyane cyane (Pallas)

(蓝鸲、青鸲、小玻璃[辞典],黑老婆儿、蓝靛杠、蓝尾巴根子、轻尾儿[北名])

英名: Siberian Blue Robin; 量度: 全长约 130, 嘴峰 11.5, 翅 74, 尾 47, 附蹠 25 毫米(♂)。

形态 上体包括两翅的内侧覆羽和飞羽概铅蓝色; 两翅余羽暗褐, 表面渲染蓝色; 尾羽黑褐, 亦沾蓝色光泽; 头和颈的两侧深蓝, 眼光转黑; 下体几纯雪白。

雌鸟上体橄榄褐色, 腰和尾上覆羽稍带蓝色; 两翅及尾均暗褐; 头侧大都淡褐; 眼圈淡棕。下体大都白色, 仅胸和两胁缀以暗褐色。


眼暗褐; 嘴近黑; 脚和趾等肉黄色。

生态 平时奔驰地上, 特别在灌木丛间, 但很少栖止于灌木上。奔驰时, 尾常上下扭动不已、叫声低微, 似“chuck, chuck, chuck...”。找食亦在地面; 所吃的几全为昆虫, 包括叩头蚋、象蚋、蚂蚁、鳞翅目昆虫等。巢以苔藓、枯叶等构成杯状, 置于地面凹陷处或穴隙间。卵每窝 4—5 枚, 呈纯玉蓝色。

色。

分布 繁殖在我国东北及内蒙古东北部; 迁徙时, 遍布我国东部。

经济意义 几乎完全吃虫, 有益于农、林。



× $\frac{1}{2}$

蓝 点 鸲 鸲科 鸲亚科

Luscinia svecica svecica (Linnaeus)

(蓝喉歌鸲、蓝桔[意即喉]、芦稿鸟[南名])

英名: Bluethroat; 量度: 全长约 140, 嘴峰 12, 翅 72, 尾 52, 附蹠 27 毫米(♂)。

形态 上体包括两翅的表面, 大都土褐色, 头顶各羽缀以黑褐色; 尾上覆羽杂以栗红色; 中央一对尾羽以及外侧尾羽的端部黑褐, 基部亦栗红。眉纹白; 眼先黑; 头侧暗褐缀棕。颊和喉辉蓝; 喉的中央具一栗色块斑; 胸在蓝色部分的后面有黑色的和淡栗色二道宽带, 两带间稍杂以白色; 腹白; 两胁和尾下覆羽棕白。

雌鸟颊下另具白色颧纹; 纹的下面黑褐, 在喉和胸的两侧各成一纵带; 这二黑带稍杂以蓝色, 并在胸前左右相接, 因而成半圈状; 颊白; 喉淡棕色。余羽与雄鸟相似, 仅色较淡。

眼暗褐; 嘴黑, 基部呈角色; 脚和趾均肉褐色。

生态 常潜匿在芦苇或低矮灌木丛间的地面上活动, 不时扭动或扩展其尾羽。飞行低且仅短距离, 由一个灌木丛飞落在另一丛中。迁徙期中, 叫声单调, 似“chic-chic——”但在繁殖时却常发出动听的歌声。取食完全为昆虫, 如象蚋等。巢以干草营置于地面凹处, 内铺以根须、毛发及更细的草等。卵每产 4—6 枚, 呈绿白或橄榄褐色, 或多或少地更缀以暗褐色斑纹。

分布 国内有 4 个亚种; 本亚种繁殖在内蒙

古东北部及东北, 迁徙时几遍全国。

经济意义 嗜吃害虫, 有益; 因善于歌咏, 亦常被饲为笼鸟, 供观赏用。



× $\frac{2}{5}$