

沙 百 灵 百灵科

Calandrella rufescens cheleënsis (Swinhoe)

(小云雀、沙鹀)

英名: Lesser Sand Lark; 量度: 全长 156, 嘴峰 10, 翅 90, 尾 65, 跗蹠 19 毫米(♂)。

形态 上体一般沙棕色, 而具黑色纵纹, 尾上覆羽棕色更著; 两翅和尾均暗褐, 羽缘淡沙棕色; 最外侧一对尾羽几全白色, 次一对外翮纯白; 耳羽淡棕; 下体大都白色, 胸有不明显的暗褐色斑点, 两胁亦杂以褐色纵纹。


眼褐色; 嘴铅褐色; 脚黄褐色。

生态 喜栖于河川旁岸草原沙地和田野等。性不甚畏人; 俟人接近时方飞去, 飞行不远又落下。在高空浮翔时, 一边急动两翅, 现出优美姿态, 一边发出悦耳的鸣啭声。觅食在草地上。食物主要为杂草种子, 夏季也食昆虫幼虫。巢营于草原或沙滩上, 由禾本科植物的茎叶和细根等筑成。卵每窝 3—4 枚, 呈绿白色而具褐色和淡紫色斑点。

分布 国内有 6 个亚种。本亚种分布于东北、

内蒙古及华北一带。

经济意义 此鸟善鸣, 为著名笼鸟之一。



× $\frac{1}{4}$

百 灵 百灵科

Melanocorypha mongolica mongolica (Pallas)

英名: Mongolian Skylark; 量度: 全长 179, 嘴峰 17, 翅 117, 尾 70, 跗蹠 26 毫米(♂)。

形态(冬羽) 额、头顶周缘和后颈均栗红色, 头顶中部棕黄; 眉纹棕白, 向后延伸至枕; 耳羽茶褐; 上体余部概栗褐色, 羽缘棕灰, 翅上覆羽大都栗红, 羽缘淡黄; 外侧飞羽黑褐, 羽缘白色, 内侧者几变纯白; 尾羽黑褐, 羽缘和羽端缀白, 最外侧尾羽几全白色。喉白; 上胸两侧具黑色块斑, 其下转为棕白; 至腹纯白, 胁部具有栗纹。


雌鸟的栗色一般较浅淡, 而褐色较著; 胸侧黑斑不如雄鸟之发达。

眼灰褐色; 嘴黑褐, 下嘴淡黄; 脚淡黄色。

生态 生活于荒漠草原。地上行走颇速, 飞翔也很快。鸣声变化甚多, 能模仿其他鸟类及猫等的鸣叫声。食物主要是各种野生植物的种子, 也食少量昆虫。巢由杂草所成, 置于草下凹坑内, 或露天地面陷凹处。卵呈白色或近黄色, 而具褐色细斑。

分布 内蒙古东部及东北部草原, 为留鸟; 不良年份中也成群徙至河北。

经济意义 鸣声悦耳, 为我国最著名的笼鸟与画眉齐名中外, 堪相媲美。此鸟每年有许多幼雏运至各地。



× $\frac{2}{5}$