


棕颈钩嘴鹛 鹛科 画眉亚科

Pomatorhinus ruficollis stridulus Swinhoe

(小偃月嘴嘈杂鸟、小钩嘴嘈鹛、小钩嘴鹛、小眉[南名])

英名: Rufous-necked Scimitar Babbler; 量度: 全长约 175, 嘴峰 18, 翅 71, 跗蹠 27 毫米(♂)。

形态 雌雄同色。上体大部棕褐, 后颈棕红, 头顶褐色较暗, 前额缀以白羽; 翅上的内侧覆羽与飞羽与背同色, 外侧者浅黑褐, 外缘沾棕; 尾羽亦浅黑褐, 表面略带橄榄棕。眉纹白, 自额伸至后颈两侧, 极其鲜明; 头侧大都黑色; 颏和喉纯白; 胸白



$\times \frac{2}{5}$

而杂以栗色纵纹; 腹部中央淡棕; 两胁和尾下覆羽均橄榄棕色。

眼棕褐; 嘴黄, 嘴峰近黑褐; 脚和趾等铅褐或铅绿色。

生态 平时生活在丘陵地带的阔叶林或灌木丛或竹丛中。性活跃, 常在树枝间穿梭跳动, 飞行仅短距离, 往往从一个灌丛急飞至另一灌丛中。叫声清晰, 似“tu-tu-tu——”, 且常有对鸣的习性, 性杂食。所吃的动物物质有豆天蛾、螻蛄、甲虫、其他昆虫及蜘蛛等; 植物性食物中有野果及杂草种子等。巢以细草、竹叶、树皮碎片及其他杂屑等织成椭圆球形, 从旁侧开孔出入, 常置于草丛或灌木丛间。卵每产 3—5 枚, 色白。略具光泽。

分布 广布于秦岭以南地区, 有 10 个亚种, 其中包括最近发现的一新亚种, 命名为湖南亚种 (*P. r. hunanensis* Cheng), 分布于湖南、贵州一带。

经济意义 嗜吃多种害虫, 有益; 还可饲为笼鸟, 供观赏用。


锈脸钩嘴鹛 鹛科 画眉亚科

Pomatorhinus erythrogenys swinhoei David

(大偃月嘴嘈杂鸟、大钩嘴鹛[南名])

英名: Rusty-Cheeked Scimitar Thrush; 量度: 全长约 230, 嘴峰 32, 翅 89, 尾 90, 跗蹠 36 毫米(♂)。

形态 雌雄相似。额, 眉纹、耳羽及背等均栗红色; 两翅表面亦然; 头顶橄榄褐, 各羽中央乌褐; 后颈、腰及尾上覆羽橄榄棕色; 尾羽黑褐, 亦沾橄榄棕色泽。眼先白而缀黑; 颏纹呈黑白相杂状;



$\times \frac{2}{5}$

颏、喉和胸均白, 前二部杂以狭细黑褐色羽干纹, 胸则具同色但甚粗著的滴状斑; 腹淡灰; 两胁亦然, 但下胁缀以橄榄棕色; 尾下覆羽棕红。

眼淡黄; 嘴黑褐, 下嘴先端角色, 脚和趾等肉褐色。

生态 习性与棕颈钩嘴相似, 常匿于低丘以至高山的茂密灌丛、藪林、草丛间, 在落叶、废屑堆中搜寻食物。大多单独或成对活动, 有时疏结小群。叫声亦与棕颈钩嘴鹛略同, 但音高而宏亮, 同时也有互相应叫的习性。食物为金龟螂、蟋蟀和其他昆虫及植物种子等。巢呈圆顶状, 旁侧上方有出入孔, 大都由草茎、蕨叶等所成, 营置于灌丛下层或在地面上。卵每产 2—4 枚, 呈白色而富有光泽。

分布 这种钩嘴鹛广布于我国西部和南部地区, 亚种很多; 本亚种产于我国东南部。

经济意义 和棕颈钩嘴鹛相同。