


银胸丝冠鸟 阔嘴鸟科

Serilophus lunatus elisabethae La Touche

(银胸阔嘴鸟)

英名: Silver-breasted Broadbill; 量度: 全长约 175, 嘴峰 14.5, 翅 91, 尾 69, 跗蹠 19 毫米(♂)。

形态 头顶灰棕, 颈项更棕, 前额沾蓝; 眉纹黑而形宽阔, 直伸至颈项; 上背和两肩灰褐, 向后渐转为腰和尾上覆羽的栗色。尾黑; 最外侧三对具有宽阔白端; 次一对的内羽近端处具一白斑。翅上羽黑, 腕缘近处各羽稍沾灰蓝色; 初级和次级飞羽黑, 基部横贯以一道淡蓝宽斑, 先端缀白; 第三



和第四枚初级飞羽的白端特阔而显; 内侧飞羽的外羽具蓝端, 内羽具栗端, 二色之间缀以白纹; 三级飞羽淡栗色。头侧淡棕, 眼先稍着棕灰黑色。下体淡珠灰, 胸和两胁较浓, 向后几转纯白; 覆腿羽黑; 腋羽灰色。

雌鸟自颈侧有一狭形银白色领环横亘胸部。

眼深紫褐色, 杂以深翠光泽; 眼周裸露部鲜黄; 嘴灰黄色, 基部橙黄, 中部橄榄绿, 会合线蓝白色; 跗蹠黄绿色。

生态 栖于平原和丘陵间各种类型的树林中, 亦见于竹藪和矮树丛间。飞行迟钝。性亦缓慢, 不畏人。曾见有小群栖在树上觅食, 虽经连续射击, 亦不惊飞。食物以昆虫为主, 有时兼吃果实及其他植物。叫声似“chir-r-r”, 轻低而富于音韵。巢由杂草、嫩枝、细茎等所成, 内垫以更细的草、竹叶和其他树叶等, 置于矮树上或灌木丛间。卵每产 4—5 枚, 色近白, 而疏杂以红褐色斑点, 尤其是在卵的钝端。

分布 此鸟在国内有 3 个亚种的分化。本亚种见于云南和广西的南部; 另有其他亚种得自云南西南部及广东海南岛。

经济意义 可利用为观赏鸟。

蓝翅八色鸫 八色鸫科

Pitta nympha Temminck et Schlegel

英名: Lesser Blue-winged Pitta; 量度: 全长约 190, 嘴峰 23, 翅 119, 尾 34, 跗蹠 39 毫米(♂)。

形态 头顶棕褐, 纵贯以一道黑色冠纹; 眉纹乳黄, 直伸至后颈; 后颈有黑色领环; 背翠绿色; 下



腰和尾上覆羽辉钴蓝色; 尾黑而具暗绿色羽端。小覆羽钴蓝; 内侧覆羽和飞羽与背同色; 外侧者均转为黑褐, 初级飞羽的基部横贯以一道白斑。头侧黑; 颊微黑; 喉白; 胸和两胁均沾淡棕绿色; 腹部中央和尾下覆羽粉红色; 腋羽黑。

雌鸟相似, 但羽色较苍淡。

眼暗褐; 嘴黑褐, 基部、先端以及嘴峰均较淡; 跗蹠为带粉红的肉黄色。

生态 大多单独在灌丛间的地面上活动, 从落叶废屑间搜索食物。行动敏捷, 往往连续急跳, 每跃逾米。巢营置于山坡上的灶状构造中, 外层为枯叶, 次为苔藓层, 色白而沾灰, 并具淡紫和紫褐色斑点, 特别是在卵的钝端。

分布 繁殖在安徽和台湾山地, 迁徙时, 见于东南沿海各省; 曾经一度偶获自河北北戴河。此鸟在国内还有 2 个亚种: *P. b. melli* 分布于广西和广东, *P. b. moluccensis* 见于云南南部。

经济意义 可供观赏。