

紫 啸 鸫 鸫科 鸫亚科

Myophonus caeruleus caeruleus (Scopoli)

(鸣鸡、山鸣鸡[北名], 鸟精[南名])

英名: Blue whistling Thrush; 量度: 全长约 300, 嘴峰 28, 翅 178, 尾 126, 跗蹠 52 毫米(♂)。


形态 雌雄相似。上体自额至背, 头和颈的两侧, 下体自颈至上腹等均深蓝色, 各羽先端悉具较有辉亮的淡紫色滴状斑; 腰、下腹、尾上和尾下覆羽等均黑褐色; 两翅及尾亦大都黑褐, 而表面均沾暗紫蓝色, 中复羽先端杂以紫白色细点。

眼暗褐; 嘴及脚、趾等均黑。

生态 常栖于多岩的溪谷间, 觅食小蟹及昆虫, 如蜂、金龟蚬幼虫等。在地上常边跃边叫; 叫声为延长的箫声, 似: “scree——”。繁殖期中, 雄鸟还能啭鸣, 富有音韵, 非常动听。巢营置于草堆下的岩棚上或石隙间, 或在庙宇檐下, 或在树枝分歧处, 用苔藓混着苇茎, 残叶等, 造成大形杯状。卵每产常 4 枚, 或几乎纯淡绿色, 或呈黄绿或淡褐色, 而杂以浓淡不等的红色细点。

分布 本亚种遍布于我国东部和中部; 在西部以至西藏另产有其它亚种。

经济意义 嗜吃害虫, 对于山林有益。



× $\frac{1}{5}$

黑 鸫 鸫科 鸫亚科

Turdus merula mandarinus Bonaparte

(百舌、反舌、鬲乌、乌鸫、乌鸲[以上南名])

英名: Blackbird; 全长约 280, 嘴峰 24, 翅 149, 尾 130, 跗蹠 35 毫米(♂)。

形态 上体概黑, 两翅和尾亦然; 下体黑褐, 颈和喉缀以棕褐羽缘。

雌鸟上体黑色带褐; 颈、喉均淡栗褐, 具有黑褐色纵纹; 下体余部黑褐沾栗。

眼褐色; 嘴黄; 脚近黑色。


生态 栖息于平原草地或园圃间, 常单独或三五成群地在地面上奔驰觅食。它的食物在秋冬二季主要为植物, 春夏二季为动物。所吃的动物以昆虫的幼虫为主, 如毛虫、孑孓、蝇蛆等。一鸟所吃的蝇蛆, 有的一次竟达 100 个之多。所吃的植物大都为樟果、榕果、其他野果及杂草种子等。

黑鸫叫声尖锐, 犹如击石一般, 音似“鸲-鸲-鸲-鸲——”, 故南方通称为“乌鸲”。繁殖期中既能吟咏, 还能仿效别鸟叫声, 因此又有“百舌”、“反舌”等的别名。巢以枝条、须根、枯草、松针等混泥而造成深杯状, 营置于乔木的枝梢上或树杈间。卵每窝

常 5 枚, 呈浅绿色, 而缀以淡灰紫和栗褐色斑纹。

分布 本亚种遍布于华南(包括海南岛), 在西藏、新疆等处另产有其他亚种。

经济意义 此鸟嗜吃昆虫, 尤其是幼虫, 如蝇蛆等, 又因它分布广, 数量多, 故很有益处。



× $\frac{1}{3}$