


白眉白腹鸫 鸫科 鸫亚科

Turdus pallidus obscurus Gmelin

(白眉鸫、灰头鸫,灰头穿草鸡、银锭[北名],白眉灰麦鸫[南名])

英名: Pale Thrush; 量度: 全长约 230, 嘴峰 19, 翅 126, 尾 83, 跗蹠 29 毫米(♂)。

形态 上体纯呈辉橄榄色; 两翅和尾浅黑褐, 羽缘亦橄榄褐, 眉纹和眼下一块斑均白; 头和颈的两侧灰褐, 耳羽缀以白纹; 颊和喉的中部、腹及尾下覆羽均白; 胸和两胁棕橙色。



$\times \frac{2}{5}$

雌鸟上体转淡橄榄褐, 而无辉亮; 喉的中部具褐纹; 下体的棕橙色甚淡。

眼暗褐, 嘴呈角褐色, 下嘴基部黄; 脚和趾等为角黄或肉褐色。

生态 迁徙时, 遇见于田野、园圃中的丛树、灌木丛间。常结群在地面落叶间, 搔刮昆虫及其幼虫为食, 亦兼吃野果、种子等。起飞前, 必急奔数步; 飞时并发出: “Che-e——” 的尖声。繁殖不在我国境内。巢与斑鸫相似, 但置于针叶树的高处。卵每产 4—6 枚, 呈淡绿色, 或多或少地缀以红褐色斑点, 有时无斑。

分布 繁殖在苏联西伯利亚; 迁徙时遍于我国中部和东部。北鸫与白腹鸫 (*T. P. Pallidus*)、红胁鸫 (*T. P. chrycolaus*) 同属于一种, 或将它们分为 3 个独立的种。

经济意义 与斑鸫相似。


赤颈鸫 鸫科 鸫亚科

Turdus ruficollis ruficollis Pallas

(红喉鸫、红脖穿草鸡[北名])

英名: Red-necked Thrush; 量度: 全长 240, 嘴峰 19, 翅 130, 尾 101, 跗蹠 32 毫米(♂)。

形态 上体灰褐, 额和头顶稍杂以黑纹; 两翅大都黑褐, 羽缘灰白; 中央尾羽黑褐, 羽缘缀以棕色; 外侧尾羽转为棕红, 仅于外缘和羽端沾些黑褐



$\times \frac{1}{4}$

色; 眉纹、颊以及下体自颈至胸均栗红; 眼先黑褐; 耳羽乌灰; 下体余部白, 胸侧和两胁具有褐斑, 尾下覆羽的羽基沾棕。

雌鸟相似, 但下体的栗红色部分较为浅淡, 并杂以白色, 喉侧并具一系列黑斑, 如颧纹状。

眼暗褐; 嘴黑褐, 下嘴基部黄; 脚和趾等绿灰至肉褐色。

生态 与其他鸫类相似。迁徙时, 常结集大群在丛生灌木的山地活动, 罕见于平野地带; 有时还和斑鸫或其它鸫类混在一起。觅食大多在地上, 遇惊即急飞至高树上, 并发出粗涩的叫声, 音似 “squeetch”。食性亦与其它鸫类相似。繁殖不在我国境内。巢以杂草混泥造成, 置于枝叉间。卵绿蓝色, 而杂以红褐色细点。

分布 此鸟有喉与黑喉 (*T. r. atrogularis*) 2 个亚种, 繁殖均在苏联西伯利亚中部和西部。本亚种迁徙及越冬时, 见于我国东北、华北及西部。

经济意义 与其他鸫类同。