


## 野 猪 偶蹄目 猪 科

*Sus scrofa* Linnaeus

(山 猪)

**形态** 外形与家猪相似，吻部十分突出。四肢较短。尾细。躯体被有硬的针毛。背上鬃毛发达，长约140毫米，针毛与鬃毛的毛尖大都有分叉。体重约150公斤，最大的雄猪可达250公斤以上。成体长约为1米到2米。雄比雌大。雄猪



的犬齿特别发达，上下颌犬齿皆向上翘称獠牙，露出唇外。雌猪獠牙不发达。毛色一般为棕黑色，面颊和胸部杂有黑白色毛。幼猪躯体呈淡黄褐色，背部有六条淡黄色纵纹，俗称花猪。

**生态** 野猪多栖息在灌木丛、较潮湿的草地或阔叶及混交林中。多夜间活动，白天亦能遇到。除了大雄猪(俗称孤猪)常单独活动外，一般结群活动。杂食性，以幼嫩树枝、果实、草根、野菜、腐肉等为食。亦食农作物，如玉米、马铃薯、稻谷等。东北地区一般在10月间交配，次年4、5月产仔，每次产仔5—6头，最多可达9头。

**分布** 遍及全国。


**经济意义** 野猪对农业有害。但肉可食，皮可制革，猪鬃是制造毛刷的原料。为山区重要的狩猎动物。

## 双峰驼 偶蹄目 骆驼科

*Camelus bactrianus* Linnaeus

(野骆驼、哈巴特埃〔蒙])

**形态** 身躯较大，酷似家驼。头较小，耳短，上唇分裂成两瓣，形如兔唇。颈长，弯似鹅颈。背具二肉峰。四肢细长。足如盘。尾较短。胼胝体胸部一个，前肢2对，后肢1对共7块。雄性生



殖器官弯转向后。与家骆驼主要的区别为峰矮小，四肢较长，毛短，掌狭。全身被以细密而柔软的绒毛，毛色多为淡棕黄色。颈部鬣毛、前臂、峰上的毛稍长，为棕黑色，尾端毛棕黑色。

**生态** 栖居于荒漠中的灌丛地带。常结成5—10头的小群。胆怯而机警，嗅觉敏锐。能耐寒暑饥渴。善长途奔跑，常做数百公里的季节迁移。春季交配，妊娠期约13个月，每胎1仔，一年后可独立生活。4—5岁性成熟。每年4—5月开始换毛。

**分布** 新疆塔里木盆地、内蒙古和甘肃与蒙古人民共和国的交界地区。

**经济意义** 数量少，为世界上稀有的动物之一。在科学研究上有着极高的价值。现已加以保护。