


麋 鹿 偶蹄目 鹿 科

Elaphurus davidianus Milne-Edwards

(四 不 象)

形态 麋鹿被称为四不象是由于它的头似马,身似驴,蹄似牛,角似鹿。体长约2米,尾长60



—75厘米,肩高1米余,雄鹿体重约200公斤,雌鹿约100公斤。雄鹿具角,角的形状与其他鹿不同,没有眉叉,主干离头部一段距离后,分前后两枝,前枝再分歧成二叉,后枝长而直,不再分叉。尾生有长束毛,尾端超过后肢的踝关节。四肢粗大,主蹄宽大能分开。侧蹄亦很显著。毛色灰棕。鼻孔上方有一白色斜纹,下颏与耳壳内面均呈白色,额及顶部沙黄色,具眼下腺。颈背有一黑褐色的纵纹延伸到前背部。体侧下部、臀与鼠蹊部为黄白色。尾末端束毛黑褐色。夏毛稀疏,呈红棕色。

生态 目前已无野生的麋鹿。北京动物园所养的麋鹿经常在溪中涉水,冬天亦如此。主要食草及各种水生植物。发情交配期在冬季,翌年8—9月产仔。

分布 麋鹿为我国特产,过去分布在华北。

经济意义 麋鹿是一种珍贵的兽类,在动物研究上具有特殊的意义。化石发现于我国黄河、淮河和长江下游。1985年在北京南苑,清朝的鹿苑故址建立麋鹿苑和江苏省重新饲养由英国引种的麋鹿。

狍 偶蹄目 鹿 科

Capreolus capreolus Linnaeus

(狍子、獐狍)

形态 中型鹿科动物,体重一般30—40公斤,体长约1米左右。肩与臀高不及1米。后肢略长于前肢。蹄狭尖。雄兽有角。角短,无眉叉,



主干离基部约9厘米处分成前后两枝,后枝又分为两叉。耳短,宽而圆。颈长。尾很短,隐于体毛内。冬毛厚密,吻部咖啡棕色,鼻端黑色。颈和体背面暗棕而稍带灰黄色调,腹部淡黄色。四肢外侧沙黄色,内侧较淡。臀部有白色块斑。夏毛短薄,体背面黄棕色,腹面淡黄色。

生态 栖于混交林及大森林边缘的疏林中,在山区灌丛、河谷或平原上亦常见到,有时跑到村庄附近。晨昏活动频繁,往往三五成群,多者可至数十头,很少单独活动。以灌木的嫩枝、芽、树皮等为食,亦吃草类。交配期在8、9月间,次年4、5月间产仔,一胎2仔,偶产1或3仔。

分布 华北、东北和西北各省区都有。

经济意义 狍肉鲜美可食,毛皮可做垫褥,能防潮湿,是重要狩猎兽。