

黑腹绒鼠 啮齿目 仓鼠科

Eothenomys melanogaster Milne-Edwards

形态 身长 90—95 毫米，尾长 35—40 毫米。体形肥满、吻短，外貌很象田鼠，但尾较长。身体背面暗锈褐色，腹面全为暗灰，胸部微染棕色，



吻和足背暗褐，尾毛稀少，上面暗褐，下淡白，但幼体颜色显著较深暗。头骨的形状亦似田鼠，但和鼯鼠的特点相似，即腭骨后缘平直，中央无下伸的小骨。但成鼠无齿根。第一上臼齿内缘具 4 凸角，外缘 3 个，第二、三上臼齿内，外缘均各具 3 凸角。

生态 栖 1000 多米山地，但亦可发现于 2000 米以上的地方，居于灌丛草地或林缘等较潮湿的地方，常成群居，洞道一般并不复杂，洞口附近可以见到有跑道，食植物种子或绿色部分，有时白天亦可见到。

分布 秦岭与长江以南各地。

洮州绒鼠 啮齿目 仓鼠科

Eothenomys eva Thomas

形态 体形短粗，尾长，耳短。体长 81—106 毫米，尾长 45—55 毫米，后足长 11—18 毫米，耳长 11—15 毫米。头部与体背毛色棕褐，毛基暗灰色。体侧毛棕灰色。腹毛灰色，具较浓的棕褐色调。尾背面毛黑褐色，其腹面与四足毛毛色较

浅，为灰色，具褐色调。头骨短阔而略扁平，颧弓粗壮。腭骨后缘平直，呈吊板状。齿式为 $\frac{1.0.0.3}{1.0.0.3}$ = 16。上、下颌臼齿咀嚼面的三角形齿突呈左右交错排列。头骨的各项特征都与棕背鼯鼠极为相似，但其臼齿终生无齿根。

生态 喜栖息于中、高山地阴暗潮湿的森林、灌丛和阳坡草地中。从山顶草坡直到海拔 800 米的各种适宜生境中均有发现。夜间活动。主要以草本植物的青嫩部分，以及幼树和灌木的嫩皮、嫩叶为食。繁殖情况不详。

分布 陕西、宁夏、甘肃、青海、四川、湖北。

经济意义 除个别地区外，其数量都很少。

