

条纹松鼠 哺齿目 松鼠科

Menetes berdmorei Blyth

(白喉岩松鼠、条线松鼠)

形态 体长200毫米左右，尾长不及体长，尾毛蓬松，尾侧及末端毛较长。吻端至眼下及两颊均为淡黄褐色，眼周为淡黄色。头顶及背部和四肢外侧带有棕黑色光泽，腰部两侧各具两条淡黄色的细纹，其间夹有深黑棕色的宽纹。腹部呈淡黄白色，毛基灰色。尾背面黑色，尾毛尖白色，毛基黑色与土黄色相间。

生态 栖息于热带和亚热带森林中。多活动于森林边缘、村庄附近的菜园及竹类阔叶树混交林的沟谷地带。不喜爬树，多在地面活动，常在

倒木乱竹间寻找食物。行动迅速，跳跃敏捷。主要食物为各种植物种子及浆果、嫩芽等，亦吃昆虫。

分布 云南南部。数量稀少。



岩松鼠 哺齿目 松鼠科

Sciurotamias davidianus Milne-Edwards

(扫毛子、石老鼠)

形态 体长200—250毫米，尾长超过体长之半，尾毛蓬松而较稀疏。后足蹠被毛。耳端无簇毛。背部及四肢外侧均为青黄色，腹面及四肢内侧为浅灰黄色。颈部略带白色。眼与耳间色较黄，眼周略带白色，耳背部有灰色斑。鼻前部色较深黑。尾色与体色相似，但尾端白毛较长。

生态 栖于山区树林或丘陵岩石较多的地区，有时也至附近的居民点活动。白昼活动，常在岩石处或树上，行动敏捷，并有一定的线路。筑窝于岩石隙缝中。其主要食物为坚果、胡桃、山桃、杏及其他种子以及农作物。

分布 河北、河南、陕西、山西、四川、甘肃、贵州、安徽、湖北、宁夏、内蒙古、辽宁等地。

经济意义 为我国特产动物。对于果树和

山区的农作物有一定的危害。

