

红尾沙鼠 啮齿目 仓鼠科

Meriones erythrourus Gray


形态 体长超过 150 毫米。尾长等于或超过体长。尾上被密毛，尾端之毛较长形成“毛束”。后足掌被毛，中央有一窄条裸露。头和体背灰棕色。两颊、眼周、耳前及体侧色较浅。胸腹部毛尖

端白色微带沙黄，毛基灰色。尾毛棕色，上面杂有黑色或黑紫色毛，尾端长毛黑色或黑紫色。头骨粗壮。听泡发达，其侧突与颧弓之鳞骨突紧相接触。门齿前面有一纵沟，第三上臼齿断面近于圆形。

生态 在半荒漠地带，常栖于农田、村庄、仓库、弃荒地上。昼夜活动。不冬眠。洞成群。储藏野生植物和栽培作物的种子。每年繁殖三次。

分布 新疆的准噶尔沙漠、伊犁谷地和吐鲁番盆地。

经济意义 严重危害农业。偷食仓库粮食。



短耳沙鼠 啮齿目 仓鼠科

Brachiones przewalskii Buchner

形态 体长约 100 毫米。体重约 30 克。尾长短于体长。耳短，其长度不及后足之半。尾被密毛，末端毛略长。后足被以稀疏的白毛，近足跟部有一裸露的窄条。头及体背淡灰棕色。两

颊、眼周及耳后色浅，近乎白色。腹面一直到喉部被以纯白色毛，白色区一直延伸到体侧。尾毛颜色比背部色浅，为淡沙黄色。尾端有少数黑紫色毛尖。头骨短，听泡发达，侧突不明显，与颧弓之鳞骨突有显著的距离。门齿孔短，其后端未到达臼齿前缘。上门齿前表面有一条纵沟。

生态 在荒漠地区，栖于生长芦苇的沙丘及农垦区灌溉水渠的堤岸。食植物的绿色部分及种子。

分布 新疆、甘肃、内蒙古西部。

