

驼鹿 偶蹄目 鹿科

Alces alces Linnaeus

(狍、堪达罕)

形态 驼鹿是最大型的鹿，最大者体重可达500公斤，体长2米余，肩高达1米余。头大而长，颈短，躯体粗大，四肢长。吻部突出，上唇肥大，鼻长。肩部隆起好象驼峰，比臀部高。尾短。蹄大，呈椭圆形，侧蹄较长。雄兽有角，角基部向侧方伸出一小段后分为眉叉及主干，眉叉有时分成两小枝，而主干却伸展成宽阔的掌状，上有3或6个弯形之小尖，角面粗糙。全身黑棕色，具鬃毛，腹部毛色较黑。耳背灰褐色，内侧淡黄色。四肢外侧棕黑色。内侧暗沙黄色。夏毛色较淡。幼兽身体无白色斑点。

生态 栖于混交林，有时亦在针叶林栖息。没有固定的栖息地，常见于多水源之地。夏季多在山沟、河谷的密林下避暑。早晚及夜间活动频繁。驼鹿的听觉和嗅觉相当灵敏。以桦树、杨树、柳树等的嫩枝、芽为食，亦食水草，春夏两季多到盐碱地舐食碱土。交配期在8—9月，次年5—6月产仔，每胎1或2仔。

分布 黑龙江省小兴安岭及内蒙古东部的大兴安岭。

经济意义 为最大型鹿科动物，国内数量稀少。



驯鹿 偶蹄目 鹿科

Rangifer tarandus Linnaeus

(四不象、角鹿)

形态 为大型的鹿，肩高1.1—1.2米，体重100—140公斤。颜面部较阔而长，鼻端被毛。耳短、尖端圆钝，被密毛。肩部稍隆起，背部和臀部平直，尾短。四肢不长，主蹄圆大，中央裂线很深，侧蹄大。雌雄均有角，分枝不多，但各枝分叉复杂，成兽的眉叉略呈掌状向前伸出，第二枝紧接眉叉亦向前方伸出，枝上再分数叉，角干离第二枝后一段距离转折向前，其后面常有短的背叉；雌鹿角较小。夏毛短，色栗棕。喉部毛长，呈灰白色。尾下面色白。四肢外侧棕色，内侧白色。冬毛密，有绒毛，呈灰白或棕灰色。

生态 栖于寒带、亚寒带森林、冻土地带或沼泽地，由于雪深和缺乏食物的关系，引起远距离的迁移。宽大而深裂的蹄适于在雪地上行走。主要以白地衣为食，亦食幼桦、柳树细枝，羊胡子草及蘑菇等。9—10月交配，次年5—6月产仔，每胎1—2仔。

分布 大兴安岭额尔古纳旗一带。

经济意义 大兴安岭西北地区的艾温克族以驯鹿为家畜作运输工具。乳、肉可食。

