

种和亚种检索表

1. 前翅几乎全为一条宽阔暗红褐色纵带占据，该纵带由前缘扩展至近后缘处，从翅基直达外缘
 雅异序尺蛾 *A. venusta*
- 前翅无红褐色纵带 2
2. 前翅黄白至浅黄色，外线由前缘至 Cu_2 一段扩展成巨大黑褐色斑或形成黑褐色至深黄褐色宽带 ...
 3
- 前翅银白色，外线细线状，其内侧有黄斑或略带黄色 6
3. 前翅外线不扩展成大斑，为一条上宽下窄的深色带，其上端外缘极为清晰，顶角处黑灰色，翅基部深色斑长约 7 mm 带异序尺蛾 *A. plumbeolineata*
- 前翅外线由前缘至 Cu_2 一段扩展成巨大黑褐色斑，下半部消失，外线大斑外缘常不清晰，顶角处颜色与大斑相同或较浅，翅基部深色斑长不大于 5 mm 4
4. 前翅外线黑褐斑扩展至外缘 丰异序尺蛾 *A. pleopictaria*
- 前翅外线黑褐斑到达或接近亚缘线 5
5. 前翅基斑长约 4—5 mm，外线黑褐斑在 M_3 处宽 3 mm 异序尺蛾 *A. pictaria pictaria*
- 前翅基斑长约 4 mm，外线黑褐斑在 M_3 处宽 4 mm 短斑异序尺蛾 *A. pictaria brevibasis*
6. 前翅外线内侧在 M 脉之间有一黄斑，有时很弱，中线在中点外侧极处凸；前后翅各线均清晰，亚缘线为一列清晰黑点 点线异序尺蛾 *A. punctilinearia*
- 前翅外线内侧在 M 脉附近弥漫黄色，但一般不形成清晰黄斑，中线不呈极度外凸状；前后翅各线模糊，亚缘线通常消失 峨眉银白异序尺蛾 *A. recurvilineata meroplyta*

异序尺蛾 *Agnibesa pictaria* (Moore, 1868)

Somatina ? pictaria Moore, 1868, Proc. zool. Soc. Lond. 1867: 645. (印度：大吉岭)

Agnibesa pictaria: Moore, 1888, in Hewitson & Moore, Descr. new Indian lepid. Insects Colln late Mr W. S. Atkinson: 256.

Hydrelia pictaria: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 415.

分布：陕西、甘肃、四川、云南、西藏；印度，尼泊尔，锡金。

本种记载下述两个亚种。

指名亚种 subsp. *pictaria* (Moore, 1868) (图版 XXII: 31)

前翅长：♂ 15 mm, ♀ 16 mm。下唇须灰黄色，额褐色，头顶灰褐色，前缘白色。胸部和第一腹节背面灰褐至深灰褐色，其余腹节黄白色。前翅白色，带不均匀的淡黄色调；基部一个深褐色与黄褐色掺杂的大斑，宽约 2.2 mm，长约为前翅长的 2/7，端部圆，斑内可见灰白色“>”形亚基线；中线在前缘处有一黄褐色模糊斑；外线处大斑由前缘至 Cu_2 ，大部黑褐色，内半带黄褐色，其上半部为向外的楔形，在 M_1 附近向外凸出，下半部球形，斑内有灰白色细纹；大斑下在臀褶处有弱小褐斑；亚缘线白色，两侧