

图 515—516 雄性外生殖器。515. 简帷尺蛾 *Amnesicoma simplex* Warren;
516. 三带帷尺蛾 *A. vacuimargo* (Prout)

以 M_1 至 Cu_2 之间更为明显。

雄性外生殖器（图 515）：钩形突基部侧叶狭窄。背兜宽阔但端部稍尖。阳端基环杯状，中突具一细长柄，端部叉状。囊形突近半圆形。抱器瓣狭长，中部毛束发达，腹缘中部微凹。抱器背耳状突中等宽，端突较长，尖端接近抱器瓣端部。抱器背基突小头状。阳茎细长，端膜具一束细刺。

雌性外生殖器（图 519）：前阴片两侧形成骨化带。骨环发达。囊颈及囊体上部侧面有一大片弱骨化区。囊片细带状，两侧不规整，长度约为囊体之半。

检视标本：1♂4♀，西藏聂拉木，1981. VI—1983. VII。

分布：西藏；克什米尔地区。

三带帷尺蛾 *Amnesicoma vacuimargo* (Prout, 1923) (图版XII: 9)

Ortholitha vacuimargo Prout, 1923, Novit. zool. 30: 195. (西藏)

Amnesicoma vacuimargo: Prout, 1937, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 104, pl. 10: e.

前翅长：♂20—23 mm, ♀21—23 mm。头胸腹均灰褐色。下唇须第一节白色，第二节深褐色，第三节浅黄褐色。前翅污白色，线条深褐色；亚基线细带状，在中室前缘处微弯，其下直立；中线为一粗壮褐带，在中室端凹入，在 M_3 以下平直并略内倾，其内侧有两条细线；外线带状，宽约 1 mm，在 M_1 与 M_3 之间向内凹陷呈弧形， M_3 以下略呈波状；翅端部颜色略深，无亚缘线和缘线。后翅黄白色，近臀角处略带黄褐色。前




图 517—518 雄性外生殖器。517. 新波帷尺蛾 *Amnesicoma neoundulosa* Xue;
518. 异波帷尺蛾 *A. paraundulosa* Xue

后翅均无中点。前翅反面浅灰褐色，可见正面斑纹。后翅反面隐见灰褐色中点。

雄性外生殖器（图 516）：钩形突基部侧叶较小，但较简帷尺蛾略宽。背兜宽阔，端部圆。阳端基环杯状，中突细长，端部具五支毛。囊形突宽大。抱器瓣狭长，中部毛簇发达，腹缘中部微凹。抱器背耳状突由基部至端部逐渐加宽，端突指状。抱器背基突小头状。阳茎短小，端膜具一束微刺。

雌性外生殖器（图 520）：前阴片两侧骨化。骨环发达。囊颈较明显。囊体小，其上半部侧面有一片骨化区，骨化较强。囊片短小，形状不规则，长度约为骨环长度的1.5倍。

检视标本：1♀，甘肃永登吐鲁沟，1986. VI. 26；4♂7♀，甘肃永登连城林场，1900—2200 m, 1987. VI—VII；1♂，同前，2200 m, 1988. VI. 18；1♂1♀，青海祁连，1977. VII. 29、31；2♀，青海门源仙米，2800 m, 1992. VII. 23—24；1♂4♀，青海同仁麦秀，2959 m, 1992. VII. 30—VIII. 1。

分布：甘肃、青海、西藏。

新波帷尺蛾 *Amnesicoma neoundulosa* Xue, 1988 (图版XIII: 10)

Amnesicoma neoundulosa Xue, 1988, Sinozoologia 6: 257, figs 1, 2; figs 4, 5 (in p. 244) (西藏：
类乌齐)