



图 519—522 雌性外生殖器。519. 简帷尺蛾 *Amnesicoma simplex* Warren;
 520. 三带帷尺蛾 *A. vacuimargo* (Prout); 521. 新波帷尺蛾 *A. neoundulosa* Xue;
 522. 中甸邻帷尺蛾 *A. vicina zhongdianensis* Xue, subsp. nov.

阳端基环卵圆形。囊形突较小。

检视标本：1 ♂ (正模)，西藏江达兵站，3 400 m，1975. VII. 25。

分布：西藏。

邻帷尺蛾 *Amnesicoma vicina* Djakonov, 1936

Amnesicoma vicina Djakonov, 1936, Ark. zool. 27A (39): 16, fig. 1a: 4. (甘肃南部)

分布：甘肃、云南。

本种包括下述两个亚种，均分布中国。

中甸亚种 subsp. *zhongdianensis* Xue subsp. nov. (图版Ⅺ：12)

前翅长：♂ 22 mm，♀ 23—24 mm。头黑褐色，下唇须第一节基部腹面和第三节尖端掺杂黄白色鳞毛。胸腹部背面深褐至深灰褐色，中胸后缘立毛簇发达，各腹节后缘有黑色横纹。前翅深红褐色；亚基线浅弧形细带状，其外缘略波曲；亚基线外侧色较浅，向中线逐渐加深，其间隐见 3—4 条细弱波状线；中线细带状，粗细常有变化，在中室端和臀褶处各有一个深凹陷，两个凹陷之间略外凸呈盾状；中点黑色短条状；外线波