

现。国外见于中南半岛,印度尼西亚,缅甸和印度阿萨姆。

### 39. 小齿狸 *Arctogalidia trivirgata* Gay (图版七,图 4)

1832 *Paradoxurus trivirgatus* Gray, Proc. Zool. Soc. London. 68 (模式产地: 马六甲 “Moluccas” )。

别名 小齿灵狸、小齿椰子猫。

鉴别特征 详见属的记述。

#### 形态

外形: 大小与椰子狸相似, 重约 2 公斤, 体长约 500 毫米。体背和体侧有 3 条背纹, 无其他条纹和斑点。头面部只颜面中央有一条窄细的白纹, 面部颈部均无斑纹是本种特征之一。尾特长, 明显地超过体长。鼻镜较短宽, 背面更较凸突, 边缘有显著的棱角。腕垫均较狭长, 掌垫和腕垫的联合长度等于或超过宽度的两倍。毛被柔软。针毛和绒毛几乎等长。

毛色: 基色褐黄。吻鼻和眼周黑褐色。面部中央有一条极细的白纹。额灰黑色, 面颊灰黄色。耳色在本种分两个类型: 白耳型者耳壳上半部茸毛和皮肤均白; 黑耳型者整个耳壳均黑。从耳后沿颈侧至前肩各有一条褐色颈纹。从肩开始, 又有 3 条背纹直至尾根。其中, 中央脊纹粗黑显著并向后贯穿整个尾背而至尾端。腹面淡乳黄色。四肢和尾的前半与背同色。脚趾和尾后半段黑褐色。

头骨: 详见属的记述。

牙齿: 据记载 (Pocock, 1933), 小齿狸牙齿甚小, 故因此得名。齿形多为原始的三尖齿状。上下颌门齿排列成直线状而与獐类相似。犬齿短钝。前 3 枚上前臼齿的齿尖尖锥形, 第三上臼齿尚有一个比较原始的内叶。上裂齿三角形, 原尖特别宽大, 几乎与外叶两个主尖的基部等宽, 此三角齿尖均呈乳头状。在前尖之前, 牙齿最前缘的齿带上尚具小的前附尖。M<sup>1</sup> 与上裂齿近似, 唯缺乏前附尖和前尖大于后尖, 内叶为宽的半圆形稜而无乳突状尖。第四下前臼齿和下裂齿的跟座均较发达。小齿狸的第二下臼齿比较特殊: 它的齿位不在齿列上而是镶嵌在下齿列的外侧缘上。齿形椭圆, 在齿稜上有 3—4 个小齿尖。

#### 亚种

##### (1) 阿萨姆亚种 *Arctogalidia trivirgata millsii* Wroughton

1921 *Arctogalidia millsii* Wroughton, Jour. Bombay Nat. Hist. Soc., 27: 600 (模式产地: 阿萨姆那加山的 “Mokokchung” )。

1832 *Paradoxurus trivirgata* Gray, Proc. Zool. Soc, Lond., p. 68 (模式产地: “Moluccas” 系马六甲的误写)。

国内仅见于云南南部西双版纳(景洪和勐腊)。

从勐腊和景洪(小勐养)获得的 3 张皮, 耳壳上半部白色。体较大, 体长 565—600 毫米。所获三张皮的背纹均在肩部中断而未与颈纹相连接。与 Pocock (1933) 对本亚种的