

现。国外见于中南半岛,印度尼西亚,缅甸和印度阿萨姆。

39. 小齿狸 *Arctogalidia trivirgata* Gay (图版七,图 4)

1832 *Paradoxurus trivirgatus* Gray, Proc. Zool. Soc. London. 68 (模式产地: 马六甲 “Moluccas”)。

别名 小齿灵狸、小齿椰子猫。

鉴别特征 详见属的记述。

形态

外形: 大小与椰子狸相似, 重约 2 公斤, 体长约 500 毫米。体背和体侧有 3 条背纹, 无其他条纹和斑点。头面部只颜面中央有一条窄细的白纹, 面部颈部均无斑纹是本种特征之一。尾特长, 明显地超过体长。鼻镜较短宽, 背面更较凸突, 边缘有显著的棱角。腕垫均较狭长, 掌垫和腕垫的联合长度等于或超过宽度的两倍。毛被柔软。针毛和绒毛几乎等长。

毛色: 基色褐黄。吻鼻和眼周黑褐色。面部中央有一条极细的白纹。额灰黑色, 面颊灰黄色。耳色在本种分两个类型: 白耳型者耳壳上半部茸毛和皮肤均白; 黑耳型者整个耳壳均黑。从耳后沿颈侧至前肩各有一条褐色颈纹。从肩开始, 又有 3 条背纹直至尾根。其中, 中央脊纹粗黑显著并向后贯穿整个尾背而至尾端。腹面淡乳黄色。四肢和尾的前半与背同色。脚趾和尾后半段黑褐色。

头骨: 详见属的记述。

牙齿: 据记载 (Pocock, 1933), 小齿狸牙齿甚小, 故因此得名。齿形多为原始的三尖齿状。上下颌门齿排列成直线状而与獐类相似。犬齿短钝。前 3 枚上前臼齿的齿尖尖锥形, 第三上臼齿尚有一个比较原始的内叶。上裂齿三角形, 原尖特别宽大, 几乎与外叶两个主尖的基部等宽, 此三角齿尖均呈乳头状。在前尖之前, 牙齿最前缘的齿带上尚具小的前附尖。M¹ 与上裂齿近似, 唯缺乏前附尖和前尖大于后尖, 内叶为宽的半圆形稜而无乳突状尖。第四下前臼齿和下裂齿的跟座均较发达。小齿狸的第二下臼齿比较特殊: 它的齿位不在齿列上而是镶嵌在下齿列的外侧缘上。齿形椭圆, 在齿稜上有 3—4 个小齿尖。

亚种

(1) 阿萨姆亚种 *Arctogalidia trivirgata millsii* Wroughton

1921 *Arctogalidia millsii* Wroughton, Jour. Bombay Nat. Hist. Soc., 27: 600 (模式产地: 阿萨姆那加山的 “Mokokchung”)。

1832 *Paradoxurus trivirgata* Gray, Proc. Zool. Soc, Lond., p. 68 (模式产地: “Moluccas” 系马六甲的误写)。

国内仅见于云南南部西双版纳(景洪和勐腊)。

从勐腊和景洪(小勐养)获得的 3 张皮, 耳壳上半部白色。体较大, 体长 565—600 毫米。所获三张皮的背纹均在肩部中断而未与颈纹相连接。与 Pocock (1933) 对本亚种的

记述略有不同。

量衡度：

外形* (衡：克；度：毫米)

标本号	性别	体长	尾长	后足长	耳长	采集地
67037	—	565	620	74	42	云南勐腊
3036	—	600	—	80	40	云南小勐养
748	—	580	690	75	38	云南小勐养

* 除 67037 号外,均为皮张测得的近似值。

XXVI. 带狸属 *Chrotogale* Thomas, 1912

1912 *Chrotogale* Thomas, Abstr. Proc. Zool. Soc. Lond., P. 17; Proc. Zool. Soc. Lond., p. 499—503.

模式种: *Chrotogale owstoni* Thomas.

参阅: Osgood, 1932, 18: 256—257; Pocock, 1933, 1011; Gregory & Hellman, 1939, 8(3): 357—359; 张荣祖、杨安峰等, 1958, 24(2): 161—163。

吻鼻部狭长而向前突出。背部有 4 条棕黑色大横斑。体侧具小斑点。足垫结构与小齿狸相似,但腕垫、踝垫相对退化,变窄小。上下颌第一前臼齿前的吻鼻部剧烈地向前伸长,致使门齿、犬齿和第一前臼齿之间具较长的齿间隙。位于上门齿之后的门齿孔 3 个,中间的一个中隔孔很大,其长度和宽度约为外侧 2 个门齿孔的两倍。上下颌 3 对门齿均很发达,大小近似而且都呈宽阔的铲状。

本属为中南半岛北部的特有属。国内仅见于云南东南部的麻栗坡、马关、河口、屏边、金平、绿春,最西仅达普洱江城,北不超过北回归线。国外仅见于越南北部。

40. 长颌带狸 *Chrotogale owstoni* Thomas (图版六,图1)

1912 *Chrotogale owstoni* Thomas, Abstr. Proc. Zool. Soc. Lond., p. 17; Proc. Zool. Soc. Lond., p. 499—503 (模式产地: 越南北部的“Yen Bai”)。

别名: 横斑灵猫、缟灵猫、八卦猫(商品名)。

鉴别特征 肩部有“八”字斑、背部有 4 条大横斑、故称“八挂猫”。前颌骨剧烈前伸。门齿孔 3 个。门齿宽阔呈铲状。

形态 略比小灵猫大,体长 500 毫米左右,尾长为体长的 60—70%,足型结构为灵猫亚科和长尾狸亚科的居间型。腕垫、踝垫与掌、蹠垫相接触,连接处的宽度接近相等。但腕垫、踝垫退化缩小,掌垫、蹠垫除最内一个小叶完全隔裂外,其余三叶仅局部被浅沟隔裂。垫的表面光滑以及垫的间隙处(趾垫和掌蹠垫之间)微被稀毛均与灵猫亚科的种类近似。

鼻镜中央沟比较特殊,中央沟在鼻尖附近消失。亦即:鼻镜的前缘中沟从唇缘开始上行不达鼻尖。过鼻尖后,在鼻背前 1/3 处或略前一点复又出现并向后延至鼻背终缘。