

种。北京及河北承德地区的未能获得头骨标本,从文献记载和对比皮张标本中,可以看出纯白的喉斑向后延伸,直达颈背并汇合,显著区别于南方亚种,符合 Allen 记述的北方亚种主要特征。

亚种

(1) 南方亚种 *Arctonyx collaris albogularis* Blyth

- 1853 *Meles albogularis* Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, 22: 590 (模式产地: 西藏东部)。
 1871 *Meles (Arctonyx) obscurus* Milne-Edwards, Rech. H. N. Mamm. 200, 202 (模式产地: 四川)。
 1911 *Arctonyx leucolaemus orestes* Thomas, Abstr, Proc. Zool. Soc. 27 (模式产地: 陕西秦岭)。
 1922 *Arctonyx obscurus incultus* Thomas, Ann. Mag. N. H. 10: 395 (模式产地: 安徽旌德)。
 1923 *Arctonyx leucolaemus milne-edwardsii* Lönnberg, Ann. Mag. Nat. Hist. 11. 322 (模式产地: 甘肃岷山)。

分布于江苏、浙江、福建、安徽、湖北、湖南、四川、广东、广西、云南、山西、陕西、甘肃、青海及西藏等地。

体形较大, 颅全长 134—137 毫米, 喉部白斑不达颈背, 颈背黑褐, 仅杂有少许白尖针毛, 老成体头骨脑颅较隆起, 额骨向外较膨胀。

量衡度:

外形 (衡: 克; 度: 毫米)

标本号	性别	体重	体长	尾长	后足长	耳长	产地
00014	♂	7500	740	150	87	30	陕西宁陕
00015	♂	8700	610	150	85	25	陕西宁陕
00001	♂	6000	580	90	100	40	陕西凤县
65236	♂	—	382	106	69	21	陕西柞水
65229	♂	1700	395	95	70	27	陕西佛坪
65075	♂	1125	322	90	58	27	陕西佛坪
65076	♂	970	317	96	55	27	陕西佛坪
65148	♂	8700	679	200	95	45	陕西紫阳
164	♂	5250	625	165	88	40	湖北巴东
00010	♀	5600	620	170	74	30	陕西佛坪
6600080	♀	7100	600	170	85	28	陕西柞水
65230	♀	6500	615	195	85	35	陕西宁陕
65238	♀	5200	645	220	95	38	陕西宁陕
65077	♀	6625	618	207	97	38	陕西宁陕
64048	♀	12500	740	—	135	—	陕西太白县

头 骨 (毫米)

标本号	性别	颅全长	颧宽	眶间宽	后头宽	听泡长	下齿列长	臼齿宽
00014	♂	126.8	78.7	33.8	68.0	18.8	44.5	15.9
00015	♂	130.8	75.0	31.0	69.0	21.0	47.4	15.3
00001	♂	—	74.3	30.2	69.9	24.3	44.0	14.6
65236	♂	101.0	54.5	25.3	48.9	18.5	24.1	—
65075	♂	85.5	48.25	23.0	44.5	11.2	22.5	13.8
65076	♂	80.2	47.5	25.0	43.5	14.5	21.5	—
164	♂	133.0	71.5	29.0	70.6	29.1	46.2	—
00010	♀	127.0	75.7	29.8	72.6	19.6	42.0	16.8
6600080	♀	137.7	80.2	32.0	72.1	20.0	47.5	15.4
65230	♀	130.0	—	24.85	—	20.8	44.1	14.1
65238	♀	132.7	75.7	27.3	73.0	23.8	46.7	16.8
65077	♀	136.2	82.3	32.8	78.1	22.3	48.5	16.65
6400122	—	129.5	66.9	28.0	63.6	18.8	46.9	15.0
64048	♀	135.7	84.5	32.1	78.8	19.8	46.5	15.3
—	♀	134.4	84.0	—	73.2	22.0	45.75	15.1
—	♀	123.7	76.1	27.75	75.0	19.2	41.8	14.0
—	♀	105.0	66.7	23.8	53.5	17.8	38.6	14.0

(2) 北方亚种 *Arctonyx collaris leucolaemus* Milne-Edwards

1867 *Meles leucolaemus* Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. Zool. 8: 374 (模式产地: 北京附近)。

1825 *Arctonyx collaris* F. Cuvier, H. N. Mamm. 3, pt. 51, pl. and text (模式产地: 不丹)。

1853 *Meles albogularis* Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, 22: 590 (模式产地: 西藏东部)。

1871 *Meles obscurus* Milne-Edwards, Rech. H. N. Mamm. 200, 202 (模式产地: 四川)。

1923 *Arctonyx leucolaemus orestes* Thomas, Abstr. P. Z. S. 27; P. Z. S. 688 (模式产地: 陕西秦岭)。

分布于河北承德及北京一带。

据文献记载, 体形较小, 颅全长 125 毫米, 喉部白斑向后延伸直达颈背并汇合, 使颈背显白, 为纯白色毛, 眼下白色条纹不达上唇边缘。老成体头骨略平直, 腭骨向外略微膨胀。

量衡度:

头 骨 (毫米)

标本号	颅全长	基 长	腭 长	颧 宽	后头宽	臼齿间宽	上齿列长
45295	127	114	77.5	77.5	68	37.0	44.0
46296	—	—	—	81.0	69.5	38.4	43.2

XVII. 水獭属 *Lutra* Brisson, 1762

1762 *Lutra*, Brisson, Regn. Anim. 13. 模式种: *Mustela lutra* Linnaeus, Syst. Nat. 10th ed. 1: 45.

参阅: Pocock, 1921, 525—546; Thomas, 1922, 10: 391—406; Pocock, 1924, 2: 161; Allen, 1929, 358: 12; Howell, 1929, 75, 1: 28; Osgood, 1932, 18: 262; Allen, 1938, 1: 410—415; Pocock, 1941, 267—316;