

头 骨 (毫米)

标本号	性别	颅全长	颧宽	眶间宽	后头宽	听泡长	下齿列长	臼齿宽
00014	♂	126.8	78.7	33.8	68.0	18.8	44.5	15.9
00015	♂	130.8	75.0	31.0	69.0	21.0	47.4	15.3
00001	♂	—	74.3	30.2	69.9	24.3	44.0	14.6
65236	♂	101.0	54.5	25.3	48.9	18.5	24.1	—
65075	♂	85.5	48.25	23.0	44.5	11.2	22.5	13.8
65076	♂	80.2	47.5	25.0	43.5	14.5	21.5	—
164	♂	133.0	71.5	29.0	70.6	29.1	46.2	—
00010	♀	127.0	75.7	29.8	72.6	19.6	42.0	16.8
6600080	♀	137.7	80.2	32.0	72.1	20.0	47.5	15.4
65230	♀	130.0	—	24.85	—	20.8	44.1	14.1
65238	♀	132.7	75.7	27.3	73.0	23.8	46.7	16.8
65077	♀	136.2	82.3	32.8	78.1	22.3	48.5	16.65
6400122	—	129.5	66.9	28.0	63.6	18.8	46.9	15.0
64048	♀	135.7	84.5	32.1	78.8	19.8	46.5	15.3
—	♀	134.4	84.0	—	73.2	22.0	45.75	15.1
—	♀	123.7	76.1	27.75	75.0	19.2	41.8	14.0
—	♀	105.0	66.7	23.8	53.5	17.8	38.6	14.0

(2) 北方亚种 *Arctonyx collaris leucolaemus* Milne-Edwards

1867 *Meles leucolaemus* Milne-Edwards, Ann. Sci. Nat. Zool. 8: 374 (模式产地: 北京附近)。

1825 *Arctonyx collaris* F. Cuvier, H. N. Mamm. 3, pt. 51, pl. and text (模式产地: 不丹)。

1853 *Meles albogularis* Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, 22: 590 (模式产地: 西藏东部)。

1871 *Meles obscurus* Milne-Edwards, Rech. H. N. Mamm. 200, 202 (模式产地: 四川)。

1923 *Arctonyx leucolaemus orestes* Thomas, Abstr. P. Z. S. 27; P. Z. S. 688 (模式产地: 陕西秦岭)。

分布于河北承德及北京一带。

据文献记载, 体形较小, 颅全长 125 毫米, 喉部白斑向后延伸直达颈背并汇合, 使颈背显白, 为纯白色毛, 眼下白色条纹不达上唇边缘。老成体头骨略平直, 腭骨向外略微膨胀。

量衡度:

头 骨 (毫米)

标本号	颅全长	基 长	腭 长	颧 宽	后头宽	臼齿间宽	上齿列长
45295	127	114	77.5	77.5	68	37.0	44.0
46296	—	—	—	81.0	69.5	38.4	43.2

XVII. 水獭属 *Lutra* Brisson, 1762

1762 *Lutra*, Brisson, Regn. Anim. 13. 模式种: *Mustela lutra* Linnaeus, Syst. Nat. 10th ed. 1: 45.

参阅: Pocock, 1921, 525—546; Thomas, 1922, 10: 391—406; Pocock, 1924, 2: 161; Allen, 1929, 358: 12; Howell, 1929, 75, 1: 28; Osgood, 1932, 18: 262; Allen, 1938, 1: 410—415; Pocock, 1941, 267—316;