



图 1071—1072 雄性外生殖器. 1071. 睡莲白尺蛾 *Asthenia nymphaeata* (Staudinger); 1072. 大白尺蛾 *A. albidaria* (Leech)

道县, 1982. VIII. 18; 1♀, 四川泸定磨西, 1 600 m, 1983. VI. 18。

分布: 北京、河北、甘肃、湖南、四川; 日本, 朝鲜, 俄罗斯。

大白尺蛾 *Asthenia albidaria* (Leech, 1897) (图版 XXIII: 3)

Hydrelia albidaria Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 20: 79. (四川: 嘉定府)

Asthenia albidaria; Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 272.

前翅长: ♂ ♀ 11—12 mm。额和下唇须灰黄褐色, 头顶、体背和翅白色。翅面斑纹近似睡莲白尺蛾, 但淡污黄色波纹更加模糊, 前翅有清晰黑色中点, 后翅中点极微小但存在。

雄性外生殖器 (图 1072): 背兜和囊形突约等大。抱器瓣狭长, 背缘中部隆起, 抱器背基突细长杆状; 抱器腹细长, 微小指状端突几乎伸达抱器端。阳茎中等大, 阳茎盲囊十分短小, 角状器为三支骨刺。

雌性外生殖器 (图 1076): 前阴片狭长骨化, 下端与囊导管交接处膜质, 囊导管骨化。囊体袋状, 由短细刺组成的囊片极长, 宽阔。

检视标本: 1 ♂ 1 ♀, 湖北神农架, 1 250 m, 1981. VI. 29、30; 5 ♂ 1 ♀, 云南丽江玉龙山, 2 800 m, 1984. VII. 15; 2 ♂, 云南永胜六德, 2 250 m, 1984. VII. 10。

分布: 湖北、四川、云南。

黑星白尺蛾 *Asthenia melanosticta* Wehrli, 1924 (图版 XXIII: 4)

Asthenia melanosticta Wehrli, 1924, Mitt. münchen ent. Ges. 14: 132, fig. (广东: 连平)