

形突为一短小细突。抱器瓣狭长简单，端半部狭窄。阳茎短粗，无角状器。

**分布：**中国，俄罗斯，日本，印度，锡金，尼泊尔，马来西亚，巴布亚新几内亚，斐济。

### 种和亚种检索表

1. 前翅翅脉上排列黑褐色脉点，内线在翅脉上加粗形成黑点 ..... 缘斑卜尺蛾 *B. costimacula*  
前翅翅脉上无深色脉点，内线通常不如上述 ..... 2
2. 前翅前缘中斑在中点上方弱小，近方形或倒梯形；♂囊形突宽度约与钩形突直径相等 ..... 3  
前翅前缘中斑在中点上方发达，呈向外倾斜的三角形；♂囊形突宽度约为钩形突直径的2—3倍  
..... 4
3. 前翅前缘中斑宽大，几乎与中点接触，中点短条形 ..... 阴卜尺蛾 *B. operosa*  
前翅前缘中斑狭小，远离中点，中点圆形 ..... 阿卜尺蛾 *B. atkinsonii*
4. 灰白色；前翅前缘中斑伸达中点外侧 ..... 印度广卜尺蛾 *B. artemidora pallida*  
浅灰褐色；前翅前缘中斑未达中点外侧 ..... 广卜尺蛾 *B. artemidora artemidora*

### 广卜尺蛾 *Brabira artemidora* (Oberthür, 1884)

*Melanippe artemidora* Oberthür, 1884, Études d'Ent. 10: 23, pl. 1: 6. (俄罗斯: 乌苏里地区)

*Brabira artemidora*: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 406.

**寄主植物：**辽东櫟木。

**分布：**黑龙江、甘肃、湖北、湖南、台湾、四川、西藏；日本，俄罗斯，印度，缅甸，尼泊尔。

中国大陆分布下述两个亚种，台湾产属于何亚种尚待研究。

### 指名亚种 *subsp. artemidora* (Oberthür, 1884) (图版IV: 27)

**前翅长：**♂ ♀ 13—16 mm。头和胸腹部背面灰白至浅灰褐色。翅浅灰褐色。前翅端部色较深；前缘有一列褐斑，其中中斑较宽大，呈向外倾斜的三角形，有时与椭圆形黑褐色中点接触，后者大而清晰；内线、外线和亚缘线浅色波状，外线呈弧形弯曲；缘毛与翅同色。后翅中线为一条褐带，常向内扩展，其外缘在雄蛾中中部凸出，在雌蛾中较直，中线外侧和浅色弧形外线内侧各有一条细弱褐带；亚基线褐色；缘毛同前翅，色略浅。翅反面颜色同正面，斑纹较弱。

**雄性外生殖器 (图 247)：**抱器瓣略短宽。囊形突舌状，其宽度约为钩形突直径的2—3倍。

**检视标本：**1 ♂，黑龙江伊春岱岭，390 m, 1962. VII. 6; 1 ♂，甘肃榆中兴隆山，1987. IX. 2; 1 ♂，甘肃迭部腊子口，2 000 m, 1990. IX. 5; 1 ♂，湖北兴山龙门河，1 350 m, 1993. VII. 17; 1 ♀，湖南桑植天平山，1981. VII. 13; 1 ♂，四川峨