



图 247—248 雄性外生殖器. 247. 广卜尺蛾 *Brabira artemidora artemidora* (Oberthür);
248. 阿卜尺蛾 *B. atkinsonii* Moore

眉山, 800—1 000 m, 1957. VI. 20. 1 ♂, 日本新潟县, 1975. VII. 21; 1 ♀, 同前, 1977. VII. 28 (日本 Sato 博士赠送标本)。1 ♂ 1 ♀, 日本新潟县, 700—1 100 m, 1979. VII. 29—31 (日本 Yazaki 博士赠送标本)。

分布: 黑龙江、甘肃、湖北、湖南、四川; 日本, 俄罗斯。

印度亚种 *subsp. pallida* Moore, 1888

Brabira pallida Moore, 1888, in Hewitson & Moore, Descr. new Indian lepid. Insects Colln late Mr W. S. Atkinson: 271, pl. 8: 12. (印度: 大吉岭)

Brabira artemidora pallida: Prout, 1936, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 92.

前翅长: ♂ 16 mm, ♀ 15 mm。体和翅灰白色。前翅前缘中斑向外下方延伸至中点外侧。

检视标本: 1 ♂, 西藏聂拉木樟木, 2 250 m, 1974. V. 17; 1 ♀, 西藏樟木, 2 400 m, 1975. VII. 4。

分布: 西藏; 印度, 缅甸, 尼泊尔。

缘斑卜尺蛾 *Brabira costimacula* Wileman, 1915

Brabira costimacula Wileman, 1915, Entomologist 48: 80. (台湾)

浅褐色。前翅端部散布深色, 前缘排列黑褐色斑; 翅脉上排列黑褐色点; 内线为锯齿形深色双线, 在其外侧翅脉上形成黑点; 外线深色锯齿形, 向外弯曲, 有浅色边; 中点黑色; 亚缘线白色, 波状缘线黑色, 间断; 缘毛浅褐色, 在翅脉端有深色点。