

准双角尺蛾 *Carige metorchatica* (Prout, 1958) comb. nov.

Cryptoloba metorchatica Prout, 1958, Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 6: 449, fig. 34. (四川: 天全)

近似双角尺蛾, 但前翅内线不清, 中点圆形, 外线较近翅中部; 后翅无外线。前翅外缘中部和后翅外缘在 M_1 和 M_3 处的凸角存在但较短, 钝圆。前翅外线在前缘、中部和后缘处各有 2—3 对鲜明的黑褐斑; 前后翅端部斑纹同双角尺蛾; 缘毛黑白相间。

未见标本。

分布: 四川。

备考: 本种除后翅无外线外, 其它斑纹与本属种类一致。前后翅翅型亦近似本属而明显不同于 *Cryptoloba*。在此将其归入本属。

角叶尺蛾属 *Lobogonia* Warren, 1893

Lobogonia Warren, 1893, Proc. zool. Soc. Lond. 1893: 345.

模式种: *Lobogonia ambusta* Warren, 1893 (印度: 卡西丘陵)

中小型蛾类。极近似双角尺蛾属, 但♀触角线形, ♂♀后翅中室端脉均不为双折角。前后翅外缘中部具发达凸角, 但后翅 M_1 处无凸角。

分布: 中国, 印度。

显角叶尺蛾 *Lobogonia conspicuaria* Leech, 1897 (图版IV: 11)

Lobogonia conspicuaria Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 19: 551. (湖北: 长阳)

前翅长: ♀12—13 mm。体和翅黄至污黄色, 略带灰绿色调, 散布黑褐色鳞。下唇须约 1/2 伸出额外, 鳞毛极粗糙。前翅内线和外线在前缘各为一个深黄褐色三角形或楔形斑, 有黑边, 其下为细带状内、外线, 黄褐色, 内线及外线下端波曲; 内线内侧和外线外侧各有一条灰绿色细带相伴, 其中外线外侧灰绿带在 M_3 处形成一个清晰的大黑斑; 中点黑色, 微小清晰; 翅端部色略深; 前缘近顶角处有两个黑点, 外缘内侧在 M_1 下方有一小黑斑; 缘毛在顶角与 M_3 之间、 Cu_1 与 Cu_2 之间和 2A 端部黑褐色, 其余黄绿色。后翅散布深灰色碎纹; 外线为灰至深灰色双线; 缘毛黑褐色与黄色相间。翅反面黄色, 有时在前翅顶角附近和后翅为桔黄色; 散布大量灰褐色碎纹; 前后翅外线均为灰褐至深灰褐色双线。

检视标本: 3♀, 湖南桑植天平山, 1981. VI. 24—VII. 5。

分布: 湖北、湖南。