

分布：北京。

雾长柄尺蛾 *Cataclysmene nebulata* Xue sp. nov. (图版XX: 23)

前翅长：♂ ♀ 15—16 mm。新种极近似北京长柄尺蛾 *C. sternecki* Prout。体型稍大，颜色略淡。前翅中点较弱小，外线外侧白色带较模糊。前翅反面外线外侧白色带十分模糊，其外侧完全无界限，由浅灰褐色逐渐向深色过渡。

雄性外生殖器 (图 925)：近似北京长柄尺蛾，但钩形突中央裂口特别深且宽阔，两侧指形突长近钩形突的 4/5 (在北京长柄尺蛾中接近 2/3)。背兜较宽阔。抱器瓣和抱器腹端突明显狭窄。角状器的骨刺大小差异特别明显。

雌性外生殖器 (图 932)：前阴片两侧骨片远较前述种类小。囊片较前种略长，凹窝略浅。

正模♂，甘肃永登连城林场，2 200 m，1988. VI. 15。副模 2 ♂ 3 ♀，同正模，1988. VII. 14—15。均孟锋采。

分布：甘肃。

斜线长柄尺蛾 *Cataclysmene obliquilineata* Hampson, 1895 中国新记录 (图版XX: 24)

Cataclysmene obliquilineata Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 349. (印度)

前翅长：♀ 16 mm。♂ 触角双栉形。下唇须近 1/2 伸出额外。体和翅黄白色，头和体背掺杂褐鳞。前翅顶角明显凸出，外缘平直倾斜，后翅外缘浅弧形，均不波曲。前翅基部至外线排列六条略向内倾斜的褐色直线，由内向外逐渐加粗，外线粗壮清晰；中点黑色，微小但清晰；翅端部为一条细线和一条灰黄褐色端带，浅色亚缘线由带内穿过，微波曲；缘线褐色纤细，缘毛白色与灰褐色掺杂。后翅中部以外在后缘附近有 6—7 条灰褐色线纹残迹，中点弱小模糊；缘线和缘毛同前翅。翅反面线纹大致同正面但较模糊，前翅基部线纹消失，其它线纹在后缘附近逐渐消失；后翅线纹向上扩展至前缘；前后翅中点较正面略大。

检视标本：1 ♀，西藏吉隆，2 800 m，1975. VII. 30。

分布：西藏；印度，不丹。

小柄尺蛾属 *Mesotype* Hübner, [1825] 1816

Mesotype Hübner, [1825] 1816, Verz. bekannter Schmett.: 338.

模式种：*Phalaena parallelaria* Villers, 1789 = *Phalaena parallelolineata* Retzius, 1783 (欧洲)

头胸腹部：小型蛾类。额光滑，喙发达。下唇须短小细弱，尖端伸达额外 (图