

台湾亚种 *subsp. basistrigaria* (Wileman, 1912) comb. nov.

Lygris basistrigaria Wileman, 1912, Entomologist 45: 170. (台湾)

Calleulype compositata basistrigaria: Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 316, pl. 32: d.

Callygris compositata formosana Okano, 1960, Annual Rep Gakugei Fac., Iwate Univ. 16 (2): 10, pl. 8: 6.

Callygris compositata basistrigaria: Inoue, 1978, Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 14: 223.

前翅两条内线合并；中线和外线在中室以下合并并逐渐变细；第四条亚缘线伸达臀角，但在近臀角处断离成斑点。后翅外线不完整，大黄斑上端的褐色带近于消失，但缘线内侧由 M_1 至 M_3 之间的两个斑点清楚；黄斑上的褐点较小。

未见标本。

分布：台湾。

川滇亚种 *subsp. apothetica* (Prout, 1940) comb. nov.

Calleulype compositata apothetica Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 316. (云南：德钦)

前翅亚缘线同指名亚种；各组细线有变化，常倾向于聚合或合并。后翅黄斑上方的两条带完整或近于消失；中点较弱小。在湖北宜昌地区此亚种过渡为指名亚种。

未见标本。

分布：四川、云南。

黑回纹尺蛾 *Chartographa intersectaria* (Leech, 1897) (图版Ⅻ：17)

Larentia (?) *intersectaria* Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 19: 667. (四川：峨眉山)

Lygris intersectaria: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 213, pl. 11: h.

Calleulype (?) *intersectaria*: Prout, 1937, ibidem 4 (Suppl.): 107.

Chartographa intersectaria: Xue, 1992, in Liu (ed.), Icon. Forest Insects Hunan China: 839.

前翅长：♂ 21—22 mm。头黑褐色。下唇须比较细，第一节腹面的长毛黄色。胸腹部背面黄色，背中线两侧排列着成对黑斑。中胸背面立毛簇发达。前翅深褐至黑褐色，线条白色；内线由前缘至 Sc 有一段细弱白线，其下消失；中线粗壮，由前缘内 $1/3$ 处伸达后缘近臀角处，略呈弧形，并在臀褶处向内伸出一支细线，后者呈弧形弯曲到后缘中部内侧；外线粗壮，由前缘到达 Cu_2 与中线汇合组成回纹，回纹内 Cu_1 脉为一白色细线，连接中线与外线，细线下留下一椭圆形小褐斑；外线外侧有一条细线，在 M_1 以下连续并在各翅脉上有白色与外线和亚缘线连接；亚缘线在前缘处不清楚，在 M_1 处与顶角发出的斜线汇合后变得粗壮，在 M_3 与 Cu_1 之间加宽并外凸至缘线，内部留下一个小黑点；缘线内侧紧邻一条细弱白线，该线在 Cu_1 下方稍粗并带黄色；缘毛在顶角和 M_3