

11. 前翅基部褐斑外缘深波曲，中域大斑常为三角形；后翅中室下角附近有一小褐斑；♂抱器腹具一个刺突 三角洄纹尺蛾 *Ch. trigoniplaga*
 前翅基部褐斑外缘微波曲，中域大斑楔形，下端平截；后翅 M_2 基部至后缘有一完整灰黑色带；
 ♂抱器腹具两个刺突 青灰洄纹尺蛾 *Ch. liva*

葡萄洄纹尺蛾 *Chartographa ludovicaria* (Oberthür, 1879)

Cidaria ludovicaria Oberthür, 1879, Diagn. d'Esp. Nouv. : 10. (俄罗斯：东南部)

Chartographa ludovicaria : Gumpenberg, 1890, Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol. 54: 310.

Lygris ludovicaria : Christoph, 1893, Stettin. Ztg 54: 35.

寄主植物：葡萄。

分布：黑龙江、北京、陕西、甘肃、湖北、湖南、四川、云南；朝鲜，俄罗斯。

指名亚种 *subsp. ludovicaria* (Oberthür, 1879)

前翅长：♂19 mm, ♀21 mm。额及头顶白色。下唇须白褐相间。胸腹部背面灰白色，腹部背中线两侧排列黑斑。翅银白色。前翅亚基线和内线各两条，中线和外线各4条，亚缘线三条，均为褐色至深灰褐色线；亚基线至外线均由前缘发出，向臀角方向倾斜，在臀角附近的一个黄斑上汇合交叉；亚基线在黄斑前到达后缘，内线到达黄斑后折向后缘，第四条中线和第一条外线近于平行，在黄斑外互相接合成一回纹；臀角处有一个较大的黑褐色斑；亚缘线由前缘到达 M_3 上方，然后消失；缘线褐色至深灰褐色，缘毛灰褐色。后翅臀角处有一个大黄斑，上面点缀着数个大小不等的黑褐色斑点；缘线黑褐色，缘毛黄白色，在 M_1 以下各翅脉端为褐色。翅反面白色。前翅反面隐见亚基线至中线各条线，中点褐色，大而圆；外线由前缘至 M_3 褐色带状，其下方为两条褐色细线；臀角附近有数个模糊褐点；顶角下方为一灰褐色斑，由前缘到达 M_3 ，其间可见第三条亚缘线，深灰褐色，其内侧有一条模糊的白色细线。后翅反面中点稍小，中点外侧由前缘至 Rs 基部有一三角形小褐斑；翅端部斑纹同正面，但褐点较小，黄斑色较浅且范围较小。

检视标本：1♀，黑龙江伊春岱岭，1957. VIII. 13; 1♂，北京百花山，1972. VIII. 1; 1♀，同前，1973. VIII. 24。

分布：黑龙江、北京；俄罗斯，朝鲜。

长阳亚种 *subsp. praemutans* (Prout, 1937) (图版III: 15)

Lygris ludovicaria praemutans Prout, 1937, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 107. (湖北：
 长阳)

Chartographa ludovicaria praemutans : Prout, 1941, ibidem 12: 317, pl. 32: d.

前翅长：♂19—23 mm, ♀26 mm。近似指名亚种。体型略大，前后翅臀角处黄斑