





187



188

图 187—188 外生殖器. 187. 灰隐叶尺蛾 *Chrioloba cinerea* (Butler), ♂; 188. 同前, ♀

片马, 2 300 m, 1981. V. 28; 4 ♂ 3 ♀, 云南腾冲大蒿坪, 2 020 m, 1992. V. 24—26; 2 ♂ 4 ♀, 云南腾冲黑泥塘, 1 930 m, 1992. V. 28—30; 1 ♀, 云南腾冲猴桥, 1 680 m, 1992. V. 31—VI. 1; 2 ♂ 2 ♀, 云南腾冲胆扎林场, 2 500 m, 1992. VI. 2—4。

分布: 四川、云南、西藏; 印度, 缅甸, 锡金, 尼泊尔。

双线隐叶尺蛾 *Chrioloba ochraceistriga* Prout, 1958

Chrioloba ochraceistriga Prout, 1958, Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 6: 450. (印度: 卡西丘陵)

分布: 四川; 印度。

四川记载下述亚种。

四川亚种 *subsp. sectilinea* Prout, 1958 (图版 III: 30)

Chrioloba ochraceistriga sectilinea Prout, 1958, Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 6: 450, fig. 41.
(四川: 宝兴)

前翅长: ♂ 9—10 mm。头浅黄色, 体及翅色较灰隐叶尺蛾浅, 土褐色。前翅顶角凸出明显, 中线和外线在前缘的黑斑细弱, 但外线在黑斑以下有不连续的黑线。♂后翅小叶瓣长约为后缘长的 1/3。

雄性外生殖器 (图 189): 钩形突狭长花瓣状。囊形突延长。阳端基环不分岔, 钩状。抱器背端突端部 1/2 伸出抱器端之外。

检视标本: 3 ♂, 四川峨眉山, 800—1 000 m, 1957. V. 17、18。




图 189—190 雄性外生殖器。189. 四川双线隐叶尺蛾 *Chrioloba ochraceistriga sectilinea* Prout; 190. 长阳隐叶尺蛾 *Ch. apicata* (Prout) (a. 阳端基环)

分布：四川。

长阳隐叶尺蛾 *Chrioloba apicata* (Prout, 1914) (图版Ⅲ：31)

Cryptoloba apicata Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 191. (湖北：长阳)

前翅长：♂ 7—9 mm，♀ 8 mm。体及翅色近似四川双线隐叶尺蛾。前翅前缘的两个黑斑大而鲜明，宽度近 1 mm，其下方中线和外线极弱甚至消失。后翅小叶瓣同前种。

雄性外生殖器（图 190）：钩形突极短宽。囊形突扁平。阳端基环“Y”字形。抱器背端突尖端伸达抱器端之外。

检视标本：1 ♀，湖南莽山，1981. IX. 10；9 ♂，四川峨眉山，800—1 000 m，1957. V. 12—IX. 15；1 ♂，云南屏边大围山，1 500 m，1956. VI. 19；5 ♂ 2 ♀，云南腾冲大蒿坪，2 020 m，1992. V. 24—26；1 ♂，云南腾冲黑泥塘，1 930 m，1992. V. 28—30。

分布：湖北、湖南、四川、云南。

盘尺蛾属 *Syzeuxis* Hampson, 1895

Syzeuxis Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 339.